


鰻鯰 *Plotosus lineatus*

	鰻鯰科 Plotosidae	Striped eel catfish; Striped sea catfish
	沙毛、海土虱	
	全長可達 20 cm	
下雜魚		全年皆有



辨識重點



- ① 海水魚；② 頭部略扁平，腹部圓，後半部側扁，尾尖如鰻尾；
③ 體側中央有兩條黃色縱帶，奇鰭之外緣黑色。

分 布：臺灣各地海域皆有。

生態習性：群集性魚類，平常大多成群結隊活動，以小蝦或小魚為食，屬夜行性魚類。當幼魚出外活動，遇驚擾時會聚集成一濃密的球形群體，稱為「鯰球」，以求保護。

棲息環境：為少數生活於珊瑚礁區之鯰魚，也常可發現於潮池、河口域或開放性的沿岸海域。

形態特徵：口部附近具有四對鬚(barbels)，鼻鬚一對，上頷鬚一對，頰鬚二對。體表無鱗。第一背鰭短，前有堅強之硬棘；第二背鰭及臀鰭與尾鰭連續相接，皆為軟條；胸鰭位頭部正後方，上緣具數枚銳利的硬棘。背鰭及胸鰭之第一根為具毒腺之硬棘。體背側棕灰色，體側中央有兩條黃色縱帶，奇鰭之外緣黑色。

釣獲方式：岸釣方式以灘釣方式垂釣，餌料以活餌或蝦仁為佳。

垂 釣 點：河口、礁岩與砂質海底。

⚠ 鰻鯰背鰭及胸鰭之硬棘呈鋸齒狀並有毒腺，其毒刺所分泌的毒液含有鰻鯰神經毒和鰻鯰溶血毒，一旦被刺到，會引起長達48小時以上的抽痛、痙攣及麻痺等症狀，甚至引起破傷風，是危險的海洋生物。