

家燕

CS 普遍夏候鳥 CM 普遍過境鳥

Barn Swallow
Hirundo rustica
17~19cm



外型特徵：體上藍黑色帶金屬光澤，前額及喉部紅色，喉胸部交界處有黑色橫帶，尾羽展開分叉明顯，近末端有白斑。嘴黑色，腹部白色或紅褐色，腳黑色。幼鳥腹部污白色，尾羽較短。



生態習性：從海岸河口平原至中海拔山區均可發現活動蹤跡。在台江地區各處都有機會見到，有繁殖族群和過境族群。以空中活動的飛蟲為食，常見於開闊地，群聚性強，在過境期間經常集結成大群。繁殖期會在建築物或橋樑下方築碗狀巢，不受干擾的狀況下會重複回到同一地點使用舊巢。

洋燕

CR 普遍留鳥

洋斑燕
Pacific Swallow
Hirundo tahitica
13cm



外型特徵：體上黑色帶有金屬光澤，前額和喉部紅褐色，胸腹部污白色，羽色和家燕相似但喉胸交界處無黑帶，尾羽短且分叉較淺。

生態習性：出現於農耕地、都市區街道和山區丘陵空域。在台江地區為普遍常見的留鳥，不同於家燕的是通常成數隻的小群活動，很少大群集結。飛行覓食，以蚊蟲為主要食物，休息時常停棲於電線或枯枝等獨立突起物，巢外觀呈半碗狀，剛離巢的數天內幼鳥在夜間仍會返回巢內停棲。

