

# 八哥


 RR 稀有留鳥

鳳頭八哥

*Crested Myna*

*Acridotheres cristatellus*

26~28cm



**外型特徵：**全身黑色，上嘴基部到前額羽毛豎起成冠狀，翼上有白斑，尾羽末端有白斑，尾下覆羽有白色細橫紋。嘴象牙白色，下嘴基部有時帶淡粉紅色，眼淡黃色，腳橙黃色。

**生態習性：**出現於低海拔到海岸地帶的綠地、樹林或農耕地，為台灣本土原生種，近年受到其他外來種八哥科的壓迫，族群日漸減少，通常成三到五隻的小群，常與白尾八哥混群。偏好在電線上或人為建築突出處活動，也喜歡在地上行走。以小型無脊椎動物、種子、果實或人類食物殘渣為食。



# 白尾八哥

CI 普遍引進種

爪哇八哥

*Javan Myna*

*Acridotheres javanicus*

23~25cm



**外型特徵：**全身大致灰黑色，僅頭部、部分飛羽及尾羽為黑色，前額羽毛略為豎起形成不明顯的冠狀，尾羽末端具有明顯的白色，翼上有白斑，尾下覆羽白色。嘴橙黃色，腳黃色。

**生態習性：**非台灣原生種鳥類，推測是籠中飼養逸出或野放的個體在野外繁殖成功。出現於低海拔到海岸地帶的綠地、樹林、農田或道路旁，為台江地區數量最多的八哥科，通常成三到五隻的小群至數十隻的大群，常在電線上活動，也會在地上行走。以小型無脊椎動物、種子、果實或者人類食物殘渣為食。

