

# 民國 94 年原住民簡易生命表提要分析

## 壹、前言

本部戶政司之全國性戶役政資訊系統於 89 年將個人資料加入原住民身分註記後，本部統計處自 90 年起定期編算原住民簡易生命表提供各界參用。有關 94 年原住民簡易生命表已編算完竣，謹將重要結果摘要分析如后：

## 貳、重要結果摘要分析

### 一、原住民零歲平均餘命

(一) 94 年我國原住民兩性零歲平均餘命為 68.19 歲，男性為 63.85 歲，女性為 73.06 歲，男、女性零歲平均餘命差距為 9.21 歲。若與 93 年相較，兩性零歲平均餘命增加 0.05 歲，男性減少 0.04 歲，女性增加 0.11 歲，男、女性零歲平均餘命差距由 93 年之 9.06 歲擴大為 9.21 歲。(詳表 1)

(二) 按原住民身分：山地原住民兩性零歲平均餘命為 66.05 歲，男性為 61.26 歲，女性為 71.27 歲，男、女性零歲平均餘命差距為 10.01 歲。平地原住民兩性零歲平均餘命為 70.62 歲，男性為 66.74 歲，女性為 75.18 歲，男、女性零歲平均餘命差距為 8.44 歲。若就山地、平地二種身分別間原住民之零歲平均餘命差距觀察，其中兩性零歲平均餘命山地原住民較平地原住民少 4.57 歲；男性零歲平均餘命山地原住民較平地原住民少 5.48 歲；女性零歲平均餘命山地原住民較平地原住民少 3.91 歲。顯示山地與平地原住民間之零歲平均餘命差異頗大。(詳表 1)

表 1 我國原住民零歲平均餘命之變動

單位：歲

身分別	94 年			93 年			增減歲數		
	兩性	男性	女性	兩性	男性	女性	兩性	男性	女性
全體原住民	68.19	63.85	73.06	68.14	63.89	72.95	0.05	-0.04	0.11
按原住民身分									
山地原住民	66.05	61.26	71.27	65.66	61.11	70.72	0.39	0.15	0.55
平地原住民	70.62	66.74	75.18	71.03	67.03	75.68	-0.41	-0.29	-0.50

## 二、原住民與全體國民之零歲平均餘命差距比較

就 94 年原住民與全體國民零歲平均餘命差距觀之，原住民兩性零歲平均餘命較全體國民少 9.23 歲，男性少 10.65 歲，女性少 7.74 歲。就身分別觀之，山地原住民較全體國民兩性零歲平均餘命少 11.37 歲，男性少 13.24 歲，女性少 9.53 歲；平地原住民較全體國民兩性零歲平均餘命少 6.80 歲，男性少 7.76 歲，女性少 5.62 歲。（詳表 2）

表 2 原住民與全體國民零歲平均餘命之比較

民國 94 年

單位：歲

身分別	零歲平均餘命			零歲平均餘命差距		
	兩性	男性	女性	兩性	男性	女性
全體國民	77.42	74.50	80.80	-	-	-
全體原住民	68.19	63.85	73.06	-9.23	-10.65	-7.74
山地原住民	66.05	61.26	71.27	-11.37	-13.24	-9.53
平地原住民	70.62	66.74	75.18	-6.80	-7.76	-5.62

註：零歲平均餘命差距 = 各列原住民零歲平均餘命 - 全體國民零歲平均餘命。

### 三、原住民與全體國民之年齡別平均餘命差距比較

就五歲年齡組之平均餘命觀察，94年原住民與全體國民平均餘命之差距，就兩性觀之，二者間以零歲平均餘命差距-9.23歲最大，40-44歲差距降為-6.80歲，65-69歲差距降為-3.31歲。就男性觀之，二者間以零歲平均餘命差距-10.65歲最大，40-44歲差距降為-7.71歲，65-69歲差距降為-3.42歲。就女性觀之，二者間以零歲平均餘命差距-7.74歲最大，40-44歲差距降為-6.05歲，65-69歲差距降為-3.66歲。顯示原住民與全體國民間之平均餘命差距，無論為兩性、男性或女性，均有隨年齡增長而逐漸縮小現象。（詳表3）

表3 原住民與全體國民平均餘命之差距—按性別、五歲年齡組分

民國 94 年									
單位：歲									
年齡別	全體國民(1)			原住民人口(2)			差距 (3) = (2) - (1)		
	兩性	男性	女性	兩性	男性	女性	兩性	男性	女性
0	77.42	74.50	80.80	68.19	63.85	73.06	-9.23	-10.65	-7.74
1-4	76.83	73.92	80.20	67.86	63.54	72.72	-8.97	-10.38	-7.48
5-9	72.95	70.05	76.31	64.14	59.84	68.95	-8.81	-10.21	-7.36
10-14	68.01	65.11	71.37	59.24	54.94	64.07	-8.77	-10.17	-7.30
15-19	63.07	60.18	66.43	54.38	50.08	59.20	-8.69	-10.10	-7.23
20-24	58.23	55.38	61.54	49.71	45.49	54.43	-8.52	-9.89	-7.11
25-29	53.42	50.63	56.67	45.05	40.96	49.62	-8.37	-9.67	-7.05
30-34	48.67	45.96	51.81	40.70	36.86	44.95	-7.97	-9.10	-6.86
35-39	43.97	41.37	46.98	36.44	32.82	40.41	-7.53	-8.55	-6.57
40-44	39.34	36.90	42.18	32.54	29.19	36.13	-6.80	-7.71	-6.05
45-49	34.82	32.56	37.44	28.75	25.79	31.80	-6.07	-6.77	-5.64
50-54	30.41	28.36	32.78	24.99	22.27	27.70	-5.42	-6.09	-5.08
55-59	26.12	24.29	28.24	21.35	19.00	23.56	-4.77	-5.29	-4.68
60-64	22.00	20.42	23.84	17.99	16.16	19.61	-4.01	-4.26	-4.23
65-69	18.13	16.85	19.63	14.82	13.43	15.97	-3.31	-3.42	-3.66
70-74	14.55	13.59	15.73	11.86	10.85	12.63	-2.69	-2.74	-3.10
75-79	11.39	10.72	12.22	9.17	8.63	9.55	-2.22	-2.09	-2.67
80-84	8.69	8.27	9.17	6.73	6.73	6.78	-1.96	-1.54	-2.39
85+	6.48	6.27	6.64	4.31	5.09	4.05	-2.17	-1.18	-2.59

## 參、分析結論

原住民之零歲平均餘命無論在兩性、男性、女性均遠低於全體國民之零歲平均餘命水準達 7 歲以上，但由近一、二年變動趨勢觀察，原住民零歲平均餘命與全體國民間之差距有逐漸縮小現象。

原住民因身分之不同，平均餘命亦有很大差異，無論兩性、男性或女性，山地原住民均遠低於平地原住民達 4 至 5.5 歲。因此，如何平衡區域間發展，加速提升偏遠、山地地區之醫療衛生水準及輔導改變生活習慣，以有效降低原住民意外、疾病死亡率，並縮小山地、平地鄉居住環境及生活品質差距，以拉近、縮小原住民與全體國民壽命差距，實為當今政府施政重要課題。