

日本鰻鱺^{カウ} *Anguilla japonica*

	鰻鱺科 Anguillidae	Japanese eel
	白鰻、日本鰻	
全長可達 150 cm，適合捕捉體長約 50-70 公分		
食用魚、養殖魚種、加工魚種		春末夏初為產卵期，11~2 月鰻線會溯河而上



辨識重點



①降河性魚種；②體延長而呈蛇狀，尾部側扁；③鱗片細小而埋藏於皮下；④體表無任何花紋，體背部為深灰色而稍帶綠色，腹部則為白色；⑤脊椎骨數為112~119。

分 布：臺灣各河口區與其中、下游皆有其分布。

生態習性：屬降河洄游性的魚類。底棲性魚種，成熟時，在秋冬季節順流而游入海中，在大洋中產卵；其產卵場可能在菲律賓東方的深海處，孵化後，隨著黑潮漂游至中國大陸、臺灣、日本及韓國沿海，經過幼魚柳葉形期的變態，而後形成鰻線，再順漲潮溯河而上，於淡水中成長。日間躲在洞穴中，夜間才出來覓食，以底棲生物、小魚、甲殼類等為食，有時亦會攝食水生植物。

棲息環境：主要棲息於河川底層與洞穴中。

形態特徵：頭中大，呈鈍錐形。口大而開於吻端，微斜裂而達眼後緣下方；下頷略突出於上頷。背鰭和臀鰭都是低平而一直延伸到尾部，和尾鰭連結成一體而不易區分彼此。

釣獲方式：船、筏釣或岸釣方式以灘釣方式垂釣，夜間以沉底釣法，餌用較有腥味的魚肉。

垂釣點：河川與河口。