


白帶魚

Trichiurus lepturus

	帶魚科 Trichiuridae	Hairtail; Largehead hairtail; Largeheaded ribbonfish
	白魚、裙帶、肥帶、油帶、天竺帶魚	
	全長可達 234 cm	
	食用魚	全年皆有，春天為產卵期；11月至翌年3月為盛產期



辨識重點



①海水魚：②體甚延長，側扁，呈帶狀，向後漸變細，末端成細長鞭狀；③體銀白色；背鰭及胸鰭淡白而呈透明狀，具不顯著之黑緣。

分 布：臺灣地區除了西部以外，各地皆產。

生態習性：暖溫水域中底層洄游性魚類，產卵時則洄游至淺海水域，喜弱光，有明顯日夜垂直分布之習性，白天至深水層，黃昏、夜間及清晨則上游至表層。

棲息環境：一般棲息於開放性之大洋水域，水深在60~100公尺間，亦常游至深遠350公尺，甚至更深之水域。

形態特徵：尾柄與肛前長的比例達40%左右。頭窄長，頭背面斜直或略突起，前端尖銳，吻尖長；眼中大；虹彩白色。口大，平直；下頷長於上頷；側線在胸鰭上方顯著向下彎，而後沿腹緣至尾端。背鰭起始於後頭部延伸至尾端，胸鰭短，末端可達側線上方；無尾鰭與腹鰭；尾端呈黑色。

釣獲方式：船、筏釣或岸釣方式在磯堤夜間垂釣，餌料以活餌或葷餌為佳。

垂 釣 點：堤防、礁岩與砂質海底。