

魚類生態及釣法

赤土魷 *Dasyatis akajei*

	土魷科 Dasyatidae	Red stingray
	紅魷、牛尾魷	
全長可達	120cm	
食用魚		全年皆有



辨識重點



①海水魚；②體盤菱形；③體盤寬比體盤長約大1.2倍，尾長比體盤長大2~2.7倍；④或頭後正中肩帶上具一平扁棘。

分 布：臺灣分布於周緣各海域。

生態習性：以小魚和甲殼動物為食。卵胎生，一胎多達10隻。

棲息環境：常出現於珊瑚礁區和河口區之沙泥底部。

形態特徵：前緣斜直，與吻端約成60度；吻端較短而呈圓錐狀突出，眼頗小，稍突起；眼徑幾與噴水孔等大。口小，尾細長如鞭，幼體完全光滑，在尾刺後方的背側面具一低的皮褶，約與吻長相等，而腹側面則有比較明顯延長的皮褶，比背面皮褶長有1倍餘。成體頭後至尾刺前具一系列小棘疏散排列，尾上幾個棘較大，平扁延長而尖利，尾刺之後沒有細小棘，若有也很稀疏；肩區內外具棘2短行，眼後具小刺1小群。體赤褐色，大者較深，體盤邊緣淺淡；眼前和眼下、噴水孔上側和後部及尾的兩側則為赤黃色。腹面近邊緣區橙黃色，中央區淡黃色。

釣獲方式：船、筏釣或岸釣方式以灘釣方式垂釣，餌料以活餌或蝦仁為佳。

垂 釣 點：砂質海底。

⚠ 尾刺有毒腺，是危險的海洋生物。