

馬拉巴石斑

Epinephelus malabaricus

 鮨科 Serranidae	Greasy grouper; Malabar grouper
朱過、石斑、馬拉巴、來貓、厲麻、虎麻	
全長可達 234 cm	
高經濟食用魚、養殖魚種	8-10 月為繁殖季



辨識重點



①海水魚；②體長橢圓形，側扁而粗壯；③體側有五條微斜之暗色褐帶。

分 布：臺灣主要分布於北部、東部及南部海域。

生態習性：以魚類、甲殼類及頭足類為食。

棲息環境：棲所多樣化，舉凡珊瑚礁區、石礫區、潮池、河口區或泥沙底區，從水深0-150公尺處皆可見其蹤跡。

形態特徵：口大；上下頷前端具小犬齒或無，前鰓蓋骨後緣具鋸齒，下緣光滑。腹鰭腹位，末端延伸不及肛門開口；胸鰭圓形，中央之鰭條長於上下方之鰭條，且長於腹鰭，但短於後眼眶長；尾鰭圓形。體淺褐色，有五條微斜之暗色褐帶，有時不顯著，腹側之帶有分叉之情形。頭部、體側、胸部、下頷腹面、口緣均具黑褐色斑點；頭部及體側另具白色斑點及斑塊之散佈。

釣獲方式：餌料以沙蝦，斑節蝦，泥鰍，也可用體型較大的蘆蝦。

垂 釣 點：堤防與礁岩。