


其他常見魚種

黑土魷 *Dasyatis navarrae*

	土魷科 Dasyatidae	Blackish stingray
	魴仔	
	全長可達 94 cm	
	食用魚	全年皆有



分 布：臺灣北部海域。

生態習性：以底棲甲殼類為主要食物；屬於卵胎生魚類，一次可以產下好幾尾小土魷。

棲息環境：主要棲息於近海的沙泥海域中，棲息深度在5-100公尺間。

形態特徵：體盤菱形，尾基部近尾刺處具幾個較大棘，扁平延長而尖利，尾刺之後有許多細小棘；肩區兩側各具一縱列小棘；眼後具一群細小棘。體背側暗褐色，大者較深，體盤邊緣淺淡；眼前、眼下、噴水孔相接處、噴水孔外緣為橙黃色，胸鰭、腹鰭及尾基部之外緣亦為橙黃色；鰓裂鼻孔外側及泄殖腔邊緣為暗色；腹面近邊緣區橙黃色，中央區白色。

⚠ 尾刺有毒腺，是危險的海洋生物。

食蟹荳齒蛇鰻 *Pisodonophis cancrivorus*

	蛇鰻科 Ophichthidae	Longfin snake-eel
	帆鰭鰻、硬骨薯	
	全長可達 108 cm	
	食用魚	全年皆有

分 布：西南沿海泥沙地。

生態習性：生活於熱帶地區，會築帶狀似圍網的巢，具地域性。肉食性，以小型無脊椎動物為食。

棲息環境：對淡水的忍耐力強，常進入河口或潟湖區，偶爾上溯至淡水域。

形態特徵：體延長，圓柱狀，尾後部稍側扁。肛門在身體中央或之後。尾端長於頭與軀幹的合長。體無鱗，全身光滑。側線孔明顯。身體無任何斑紋。齒小，顆粒狀，排列不整齊，呈帶狀。胸鰭發育完整；背鰭起點在胸鰭中央部位上方。背鰭、臀鰭均止於尾端的稍前方，不相連續；背鰭、臀鰭鰭條在近尾端處較高。縱帶鰭具有黑色邊緣。

