

橫帶棘線牛尾魚 *Grammoplites scaber*

	牛尾魚科 Platycephalidae	Rough flathead
	竹甲、狗祈仔、牛尾	
	全長可達30 cm	
	食用魚	全年皆有

分 布：臺灣分布於西部。

生態習性：活動性差，常停滯於一地或潛入沙中，以小魚及甲殼類為食。

棲息環境：砂泥底、近海沿岸。

形態特徵：體色為上部棕色，下部分較淡，背及體側有不明顯的縱斑。第一背鰭有非常小的斑點，形成一稍明顯的黑直斑。腹部有相似斑點。第2背鰭、臀鰭及尾鰭有數列棕色斑點。



玳瑁石斑魚 *Epinephelus quoyanus*

	鰩科 Serranidae	Rockfish grouper; Barred-chest rock-cod
	石斑、過魚、黑貓鰨、花鰨、深水鰨仔	
	全長可達30.8 cm	
	高經濟食用魚	全年皆有

分 布：臺灣各地皆有產，以澎湖產量較多。

生態習性：幼魚常被發現於潮池，以甲殼類、小魚及蠕蟲為食。

棲息環境：主要棲息於近岸碎屑的珊瑚礁區。

形態特徵：背鰭鰭棘部與軟條部相連，無缺刻，具硬棘XI，軟條16~18；臀鰭硬棘III枚，軟條8；腹鰭腹位，末端延伸不及肛門開口；胸鰭圓形，中央之鰭條長於上下方之鰭條，且長於腹鰭，但短於後眼眶長；尾鰭圓形。頭部、體部及各鰭淡色，均有圓形至六角形暗斑密佈，斑間隔之狹窄自成網狀圖案；腹部在胸鰭基部前方具2條暗色帶；胸鰭斑點不甚顯著。

