

褐籃子魚 *Siganus fuscescens*

	籃子魚科 Siganidae	Rabbitfish; Spinefoot; Doctor fish
	臭肚、象魚、樹魚、羊鍋、疏網、茄冬仔	
	全長可達40 cm	
食用魚	全年皆有	

分 布：臺灣各沿岸海域及離島均有產。

生態習性：常成群活動。雜食性，以藻類及小型附著性無脊椎動物為食。白天在水層中覓食，夜間則至底層休息。

棲息環境：在熱帶地區，棲息於平坦底質的淺水域或珊瑚礁區，而在緯度較高的水域，則棲息於岩礁區或淺水灣區。

形態特徵：背鰭棘與軟條之間有一缺刻；尾鰭稍分叉，但隨體形增加，分叉愈深。體側上方為褐綠色，下方為銀白色；並雜以白色微帶淺藍的圓形斑。這些圓形斑沿體縱軸排列成行。側線至第一背鰭棘間，斑點較大，側線下方，斑點較小，排列較不規則。鰓蓋後上方有一污斑。

⚠ 各鰭鰭棘尖銳且具毒腺，刺到使人感到劇痛。



鱧^カ魚 *Channa maculata*

	鱧科 Channidae	Snakehead
	斑鱧、鮎魮、雷魚	
	全長可達45 cm	
食用魚	全年皆有	

分 布：臺灣分布於西部河川中、下游、池塘與溝渠等。

生態習性：能在缺氧或淤泥中生活。常藏身於水草或水底襲擊小魚及其他水生動物。成魚會築巢及具護幼習性。

棲息環境：棲息於河流、池塘與溝渠等水生植物雜生和淤泥底質的靜水域或緩流處，為本土的淡水魚種。

形態特徵：背鰭僅具軟條38~45；具腹鰭，但小型；尾鰭圓形。體灰黑色，腹部灰色；體側有不規則的大型黑斑二行，尾鰭基部前後有黑白交錯之橫紋，在幼魚時更明顯。

