



白鵲鴝 カハ

CR 普遍留鳥 CW 普遍冬候鳥

牛屎鳥仔（台語）

White Wagtail
Motacilla alba

16~18cm



外型特徵：整體白色、灰色、黑色相間的鵲鴝，台灣有兩個較常見的亞種：白面亞種 (*M. a. leucopsis*) 雄鳥頭後到背部、翼及尾羽均為黑色，體下除胸部中央黑色以外，其餘部分均為白色；雌鳥似雄鳥，但背部鼠灰色。灰背眼紋亞種 (*M. a. ocularis*) 似白面亞種，但有黑色過眼線，背部鼠灰色。嘴黑色，腳黑色。

生態習性：出現於中低海拔山區到海岸地帶的開闊地、農耕地、河床、或都會區綠地，常在地面、石頭或建築物上行走，偏好靠近水的環境，尾羽經常上下擺動，飛行時成大波浪狀。以水域邊之小型無脊椎動物為食。



大花鵲 カハ

UCW 不普遍冬候鳥

田鵲
Richard's Pipit
Anthus richardi

17~18cm



外型特徵：全身大致黃褐色，頭頂有黑色縱紋，背部有黑褐色縱斑，肩線淡黃色，有黑色顎線，翼及尾羽黑色帶有黃褐色羽緣，胸部有稀疏縱斑。上嘴黑褐色，下嘴黃褐色，腳暗紅褐色。

生態習性：出現於平原到海岸附近的開闊地、農耕地或草原，通常單獨出現，常在地面上行走，飛行時略成波浪狀，以小型無脊椎動物或植物種子為食。

