

馬鞍藤 | *Ipomoea pes-caprae*

科別：旋花科

俗名：鬘藤、厚藤、馬蹄草

外觀特徵：多年生匍匐性的木質藤本，葉互生，先端凹裂，形如馬鞍。花紫紅色，漏斗狀，腋生，聚繖花序，蒴果。全株光滑無毛，有乳汁，常帶紫紅色，耐鹽又耐高鹼性土壤。花大而且色彩艷麗的馬鞍藤，有「海濱花后」之稱。

觀察要點：通常是沙岸最前線的植物群落，匍匐性生長，葉如馬鞍，花紫紅色漏斗狀。



馬鞍藤（花） / 周民雄攝

平原菟絲子 | *Cuscuta ampestris*

科別：旋花科

俗名：菟絲子、無根草、豆寄生、濱絲菟子、吐血絲、金絲草

外觀特徵：全株由金黃色的絲狀莖所構成，不含葉綠素，因此無法行光合作用自營生活。葉片退化成膜質細鱗片狀，根也在發芽幾天後，找到寄主即消失。莖細長，攀緣性纏繞在寄主身上，會長出吸盤吸附寄主，伸入寄主的維管束中吸取營養。寄主植物範圍非常廣，多達百種以上。於夏、秋間開出白色小花後，即結出大量的種子，利用種子越過寒冷的冬天，原產於北美洲，已名列世界入侵性雜草之中。



平原菟絲子（花與吸盤）
/ 陳秋伶攝

觀察要點：黃色絲狀的莖上有吸盤。平原菟絲子喜寄生於草本植物及低矮的灌木，相較之下，另一種日本菟絲子則常寄生於木本植物，懸垂於樹冠。



平原菟絲子（全株） / 黃嘉隆攝