

陽明山國家公園

植物生態景觀資源

主持人：黃 增 泉
協同人：謝 長 富
楊 國 穎
湯 惟 新

內政部營建署委託
台灣大學植物學系調查
中華民國七十二年七月

卷之三

目 錄

壹、前言.....	1
貳、植被概況.....	2
(一)過去的植被概況.....	2
(二)目前的植被概況.....	2
參、植物的種類.....	5
(一)特產及稀有的種類.....	5
(二)稀有的種類.....	7
(三)野生杜鵑花的種類.....	7
(四)優勢的種類.....	10
(五)其他常見的種類.....	13
肆、植被景觀.....	24
(一)水(濕)生植被.....	24
(二)草原植被.....	29
(三)森林植被.....	30
伍、植被之維護及利用.....	40
(一)特殊及稀有植物保護區.....	40
(二)特殊植被保護區.....	40
(三)野生杜鵑花遊憩區.....	42
陸、參考文獻.....	44
附錄一 陽明山國家公園自生植物名錄.....	45
附錄二 陽明山國家公園栽植植物名錄.....	91

1876

壹、前 言

陽明山國家公園位居大台北地區之北側，以大屯山火山群為其主體。主要的火山有大屯山、菜公坑山、面天山、小觀音山、竹子山、七星山、紗帽山、大尖後山、磺嘴山、烘爐山等，其中以七星山為最高，海拔達 1120 公尺。區內的溪流，均自中心四射，源高流短，急湍紛歧，主要溪流有雙溪、南磺溪、北磺溪及瑪𨱈溪等。

由於大屯山火山群處於台灣本島最北端，為一孤立之山系，因此氣流之變化較活潑而敏感。公園之中央區域地勢較高，年平均氣溫約為 $15^{\circ} - 19^{\circ}\text{C}$ ，除盛夏極少日數外，常年幾無炎熱天氣。冬季較為寒冷，月平均氣溫約為 $9^{\circ} - 13^{\circ}\text{C}$ 。氣溫偶降至 0°C 以下者，而發生凝霜積雪。本區雨量充沛，年平均雨量多在 4000 公厘以上。降水特色為秋雨最多，春雨最少。全年降雨日數約在 200 日左右。年蒸發量僅有 750—900 公厘，與降水量相較，顯然瞠乎其後，因而多餘水分大多由逕流向低地宣洩。本區東北與西南方之山坡，復因受季風之影響而略有不同；前者當東北季風之衝，冬半年雲霧瀰漫，十分陰濕；後者該時期處於背風面，天氣雖亦陰沉，但降水量減少。夏季時東北方之天氣較佳。

上述地形及氣象等因素對植被的影響甚為重大，譬如台灣龍胆、南燭、白珠樹、昆欄樹及金毛杜鵑等多量分布於中央山脈海拔 2000 公尺以上區域的種類，在此區亦隨處可見。

貳、植被概況

一、過去的植被概況

依據日據時代所發掘出石器時代先民所使用之石器、土器及鹿、羨、豹等的角、齒及骨頭看來，此區在過去乃是先民狩獵之區。此等野獸棲息之先決條件，必定是茂密的森林。

郁永河於清康熙36年渡台一遊，發現今日新北投西北1公里處即已進入荆棘密林中，此密林在其「裨海紀遊」一書中記載為「林木蓊翳，大小不可辨名，老藤纏結其上，若虬龍環繞，風過葉落，有大如掌者。又有巨木裂土而出，兩葉始蘖，已大十圍，導人謂楠也。……樹上禽聲萬態，耳所創聞，目不得視其狀。」

同治年間及光緒初年，台灣烏龍茶之名聲遠播，因此北投附近農民為開地栽植及獲取炭火而開始濫墾，同時放火燒山。至1877年左右，從大稻埕（建成及延平區）北望所見之山岳丘陵，幾乎均化為茶園。隨後果樹的栽培，牛群之放牧陸續不斷，自然林相破壞殆盡。到日據時代大正十三年為止，在公園中心地區包括七星、小觀音、菜公坑、大屯、面天、及紗帽諸山所殘存之原始闊葉樹林、相思樹林及馬尾松林合計僅311甲。其餘均為草生地，廢耕地及台灣矢竹林。為涵養水源，增進景緻，日總督府開始著手大規模的造林工作。自大正十三年至昭和四年之間，每年均造植200甲林地。栽植之樹種依據生育地環境而加以選擇，分別為日本黑松436甲、琉球松202甲、台灣二葉松199甲、相思樹129甲，其他尚有福州杉、扁柏、廣葉杉、樟樹、赤松、竹柏等。另外為觀賞之故，還於路旁大量種植山櫻、本省特有之霧社櫻、及日本種之吉野櫻、大島櫻、緋寒櫻、八重櫻等。昭和六年至十一年間，在小觀音山至竹子山一帶之草生地及疏林地區，復造植日本黑松194甲、琉球松131甲、福州杉151甲、扁柏41甲、廣葉杉48甲、相思樹31甲、台灣二葉松23甲、及竹柏、樟樹等6甲。光復後也陸續栽植一些樹種，其分佈甚廣，但均為小面積，主要樹種為柳杉及松樹。


二、目前的植被概況(圖一)

1.人工林

以上歷年來之新舊造林事業，成敗均有，到目前為止針葉成林分佈於大屯西峯西南側、面天山東側、竹仔湖南側、頂山與大尖山所夾持之南向溪谷近稜頂處。其餘各地之針葉樹種或枯亡，或零零散散而被其他樹種所淹沒。最成功的人工闊葉林當推相思樹林，幾乎海拔700公尺以下之區域，處處皆是。

2.天然闊葉林

公園區內天然闊葉林之分佈相當廣泛，舉凡針葉林、草原帶及農作區外均是。但真正未遭受破壞的原始林卻極為有限，一般所見均為自然更新至不同階段之次生林。原始林及



圖一 植被略圖

更新至接近原始林狀況之闊葉樹林分佈於竹子山—嵩山稜線海拔800公尺以下至磺溪上游間、大尖後山及磺嘴山四周坡面及溪谷間、七星山南坡、以及紗帽山北坡等處。闊葉林中混有或多或少人工針葉樹種的區域則為大屯山東西兩坡面，七星山西坡、菜公坑山及百拉咾山、以及竹子山—嵩山稜線西北側等處。

3. 草原帶

草原分佈廣泛，亦為本公園之特色之一。草原之形成及持續有自然及人為之因素，如風力、廢耕、放牧等均是。草原分佈區有大屯山稜，七星鞍部向東北延伸至竹子山之主稜及支稜上，七星山頂及北向、東向之坡面，陽明山農場至竹嵩山一帶，面天山、大尖後山、磺嘴山、大尖山、頂山等山巔。草原又可分為台灣矢竹、台灣芒及五節芒之草原。擎天崙以東之草原均以台灣芒及五節芒為主；以西則以台灣矢竹及台灣芒為主。

4. 農作區

公園境內農作區零散分佈，可分為耕作區及果樹等。耕作地多分佈於公園之周邊地區，限於谿谷以及有灌溉之利的地區，每以梯田形式開置，如陽明山公園西南側、富士坪及大坪、磺溪頭、尖山湖、二坪頂、頂湖及後山等處。栽植作物以水稻為主，另有蔬菜、甘藷等。有些區域每因廢耕而成為草地，如中興農場、大屯坪等處。凡緩坡及地形起伏之岡阜多栽植果樹、茶樹及竹子，尤以柑橘為多，如大屯山、面天山之南坡海拔七、八百公尺以下區域。其他尚有少數地區開為苗圃，以培育花卉、樹苗。

參、植物的種類

陽明山國家公園境內自生的植物有1224種，分屬於170科。其中蕨類植物181種、裸子植物2種、雙子葉植物747種、及單子葉植物294種。總和約佔全省植物種數之三分之一。所有植物種類如附錄一所示。其中具有觀賞、藥用、建材等價值的種類不在少數。另外歷年來為進行美化、造林或供給食用所栽植之外來植物亦很多，其種類如附錄二。在自生種中，台灣水韭、大屯杜鵑、中原杜鵑、鐘萼木、島槐等是公園區之特有種，同時也是稀有之種類。八角蓮及四照花則屬於本島之稀有種。本區所產杜鵑花計有六種，可供觀賞之用。數量多、分佈廣泛的優勢種有十餘種，其他尚有許多常見之種類，現分別略述其性狀及分佈狀況。

一、特產及稀有的種類(其分佈如圖二)

(1)台灣水韭 Isoetes taiwanensis Devol

屬於擬蕨類中之水韭科(Isoetaceae)，莖呈鱗莖狀；葉叢生，長7—24公分，內側平，外側弧凸，葉肉內有4氣室；孢子囊長於葉下端之內側，能產生大小兩種孢子。

本種僅分佈於夢幻湖中，為稀有珍貴之種類。平時長於水底，遇枯水季也能露出而附生於濕潤之地上。

(2)大屯杜鵑 Rhododendron longiperulatum Hayata

屬於杜鵑花科(Ericaceae)，為直立灌木，枝條上有毛。葉形多變，自卵形至橢圓狀披針形均有，1—2.5公分長，0.5—1.5公分寬，上面綠色，下面灰綠，兩面均有毛。花頂生，紅色，漏斗狀，長寬各約3公分，裂為五瓣。

本種為大屯山之特產，分佈於大屯山頂至大屯坪一帶之草生地中。花期在四月中下旬，較金毛杜鵑略遲。

(3)中原杜鵑 Rhododendron nakaharai Hayata

屬於杜鵑花科，十分矮小，偃伏於岩壁上，多分枝，枝上有毛。葉小，多聚生枝端，卵形至橢圓形，約1公分長，兩面均有毛，惟下側脈上之毛較密集。花1—3朵頂生，深紅色，長寬各約3.5公分。

本種為七星山之特產，分佈於七星山頂四周之岩壁上，密集平臥。花期在六、七月間，是公園區內最遲開放的杜鵑花。

(4)鐘萼木 Bretschneidera sinensis Hemsl

喬木，高可達10公尺，奇數羽狀複葉長80公分；小葉3—6對，對生，長橢圓形，狹卵形至狹倒卵形，基部略歪，長9—20公分，寬3.5—8公分，上面無毛，下面被短柔毛。總狀花序頂生，長20—30公分。花萼鐘形；花瓣5，粉紅色，長2公分；雄蕊5—9。



圖二 特產及稀有種類分佈圖

蒴果圓球狀，長2—4公分，木質。

本種原屬於鐘萼木科(*Bretschneideraceae*)，Hutchison(1973)將之併入無患子科(*Sapindaceae*)。其分佈地為雲南東部、廣西、廣東、江西、浙江、湖南、貴州、湖北、及四川等地。最近始被林業試驗所，呂勝由先生發現，僅分佈於馬槽附近及頂湖附近之闊葉林中，花期在四月。

(5)島槐 *Maackia floribunda* (Miq.) Takeda

屬於豆科(*Leguminosae*)，灌木或小喬木。葉為奇數羽狀複葉；小葉5—10對，對生，長橢圓形，長3—5公分。總狀花序長8—10公分，被有黃褐色柔毛，花密。莢果細長橢圓形，扁而薄，內藏種子1—2粒。

散生於大屯山、上磺溪上游等地之闊葉林中，為本省之唯一產地。

二、稀有的種類(其分佈如圖三)

(1)八角蓮 *Dysosma pleiantha* (Hance) Woodson

屬於小檗科(*Berberidaceae*)，為多年生草本植物；莖獨立單生，先端具一或二葉。葉圓盾形，具6—8淺裂片，徑約30公分，邊緣有毛。花5—8朵，長於二葉柄連接處，向下懸垂；萼片6，深紫色；花瓣6—9，黃褐色；雄蕊6，漿果長橢圓形。

本種之根莖為治蛇咬傷之著名藥材。由於長年之採收，以致變為罕見之種類。目前在面天山、小觀音山及磺嘴山一帶之森林中尚餘有少數植株。

(2)四照花 *Cornus kousa* Buerg

屬於山茱萸科(*Cornaceae*)，為落葉小喬木或灌木，小枝紅褐色，光滑。葉有柄，對生，闊橢圓形，長3—8公分，寬3—7公分，表面深綠色，裏面綠白色。花黃白色，形成頭狀花序，基部有四花苞，長2—3公分，黃白色，具淡綠色縱脈；花瓣，長1.5公分；雄蕊4枚。核果相聚而成球狀集合果。

本種具有觀賞價值，十分稀少。本區僅見於磺溪上游楓林瀑布邊之闊葉林中。

三、野生杜鵑花的種類(其分佈如圖四)

本區計有杜鵑花六類，其分佈以中區及西區為主。春季開花，互相暉映，可供觀賞。

(1)大屯杜鵑一如前述。


(2)中原杜鵑一如前述。

(3)紅星杜鵑 *Rhododendron rubropunctatum* Hayata

屬於杜鵑花科，為常綠小喬木，高可達4公尺，小枝無毛。葉厚革質，長橢圓形至倒披針形，8—10公分長，全緣；表面平滑，內面散佈紅褐色小點；葉柄2—3公分長。花多朵聚成繖狀，著生枝頂；花冠白色至淡紫色，徑約4.5公分，五裂；裂片圓，先端微凹



圖三 稀有種類分佈圖



圖四 野生杜鵑花分佈圖

。

本種產於七星山及北插天山，頗為稀少。早年葉公坑山有大片群落存在，十分有名，目前已無踪影。七星山也僅於近山頂處之台灣矢竹林中才有分佈。花期在四月。

(4) 金毛杜鵑 Rhododendron oldhamii Maxim

屬於杜鵑花科，為常綠灌木，全株密被黃褐色黏質腺毛。葉叢生枝端，紙質，披針狀長橢圓形至橢圓狀卵形，長4—8公分，寬1.2—4公分。花1—3朵頂生；花冠紅色，徑約4公分。

本種是公園區內產量最多的一種杜鵑花，大屯山、面天山、葉公坑山、小觀音山、竹子山等公園之西半部隨處可見，在草生地、矢竹林以至森林中均有其蹤跡。每屆三、四月間開花。

(5) 西施花 Rhododendron ellipticum Maxim

屬於杜鵑花科，為常綠灌木，小枝無毛。葉略硬，無毛，叢生枝端，橢圓狀披針形，長6—12公分，表面深綠光滑，內面淡綠；葉柄長1.5—2公分。花2—3朵聚生枝頂；花冠白色至淡紅色，並具有黃綠色或紫色斑點，漏斗形，徑約6公分。

本種在馬槽至大油坑的公路右側山坡上有較多的分佈，其他地區如七星山南坡，大屯山東坡等闊葉林中則極為稀少。花期是在四月。

(6) 守城滿山紅 Rhododendron mariesii Hemsl. & Wilson

屬於杜鵑花科，為落葉性小灌木，小枝平滑。葉紙質，2—3枚聚生枝端，卵狀菱形，長2.5—6公分，寬2.5—3.5公分，表面平滑，內面中肋有毛。花先葉開放，單生，淡紫色，有紫紅斑點，徑約5公分。

本種分佈於森林下，特別是七星山周圍。

四、優勢的種類

1. 蕨類植物

(1) 芒 Dicranopteris linearis (Burm. f.) Under.

屬於裏白科 (Gleicheniaceae)。枝葉常呈攀緣狀，二叉分歧，每一分歧點有一休眠芽及一對向後之附屬羽片。頂生羽片呈羽狀深裂，裏側灰白，15—30公分長。

本變種在冷水坑一帶常呈大群落出現，有時與雙扇蕨混生。

(2) 雙扇蕨 Dipteris conjugata Reinw

屬於雙扇蕨科 (Dipteridaceae)。根莖橫走，被覆黑褐色鱗片。葉柄甚長，葉片扇形，由二片所合成，每一片復深裂，因此又有「破傘蕨」之稱。葉背略呈灰白，成熟後長出許多孢子囊群。

(3) 栗蕨 Histiopteris incisa (Thunb.) J. Sm.

屬於鳳尾蕨科 (Pteridaceae)。根莖長而匍匐，被有鱗片。葉柄基部具黑褐色鱗片；葉軸能不斷向前生長；葉身為三回羽狀複葉，其羽片多為對生，內側灰白；基部小羽片較小，似托葉。孢子囊長於各羽片邊緣。

本種在溫泉附近，草生地上十分常見。

(4)廣葉鋸齒雙蓋蕨 Diplazium dilatum Blume

大型之陸生蕨類，根莖直立，具有細長褐色之鱗片。葉柄長30—55公分；葉身二回至三回羽裂，長50—80公分；小羽片披針形。孢子囊群細長，單獨或成對生長，具孢膜。

本種分佈於濕度適中之森林底下。

2.草本植物

(5)潤葉樓梯草 Elatostema edule Rob.

屬於蕁麻科 (Urticaceae)，為多年生草本。葉互生，呈長橢圓形，長10—17公分，寬5—9公分，先端尾尖，基部歪斜，邊緣有粗鋸齒；葉柄近乎沒有。花序扁球狀，着生於葉腋，有雌雄之分。

在陰濕之密林下，常成群分佈。

(6)冷清草 Elatostema lineolatum Forst. var. major Thwait.

屬於蕁麻科，多年生草本，全株被有短毛。葉互生，倒卵狀披針形，長7—13公分，寬4—6公分，先端尾狀漸尖，基部歪形，上部邊緣明顯齒狀，葉柄極短。花雌雄異株，形成腋生頭狀花序。

分佈於林下陰濕之處，成群聚生。

(7)台灣芒 Misanthus sinensis Anders. var. formosanus Hack.

屬於禾本科 (Gramineae)，稈直立，高可達1.5公尺。葉片常被覆白粉及柔毛，長可達40公分，寬至1公分；葉舌圓頭，先端有毛。圓錐花序長達35公分，主軸有毛；小穗對生，均有柄，同型。

本種在七星山、大屯山、竹子山等山坡及稜脊上成群聚生，有時與台灣矢竹混生。秋天開花，結實後，整個花序變成白色，十分美觀。

(8)五節芒 Misanthus floridulus (Labill.) Warb.

本種與台灣芒相類似，惟花序之主軸較側生之分枝為長，以致整個花序外觀上呈圓錐狀。本種分佈於墾植處，廢耕地及破壞地，如磺嘴山、大尖山、頂山、五指山等稜脊處常有大片之群落。

3.木本植物

(9)台灣矢竹 Sinobambusa kunishi (Hayata) Nakai

屬於禾本科 (Gramineae)，稈直立，光滑，高可達6公尺，徑1—2.5公分，節

間長20—35公分；側枝一般3，但有時多條叢生。葉脫落性，初為淡綠紫色，後變成灰褐色，外側有密毛。葉1—3生於枝端，長橢圓披針形，長10—25公分，寬2—2.5公分，先端銳形，基部楔形，脈7—9條。

本種在七星山、竹子山、大屯山、小觀音山一帶有廣大之群落，每年四月中旬發新筍，可供食用。

(10) 狹瓣八仙花 Hydrangea angustipetala Hayata

屬於虎耳草科(Saxifragaceae)，為灌木。葉對生，膜質，卵形至披針形，長8—12公分，寬2.5—3.5公分，略有毛。花序為頂生聚繖花序，有性花及無性花混生；無性花具4大小不等的增大萼片。

本種之增大萼片類似花瓣，白色，十分美麗，花期為五月。公園區內各處均可見到，十分普遍。

(11) 黑星櫻 Prunus phaeosticta (Hance) Maxim.

屬於薔薇科(Rosaceae)，為常綠喬木。葉略呈革質，長橢圓狀披針形或長橢圓狀卵形，長7—12公分，寬1—4公分，先端尾狀銳尖，基部廣楔形，上面綠色，下面灰綠而散生多數黑色斑點。花小，形成腋生總狀花序。果實球形，徑7—8公厘，熟時呈紅色。

本種在森林中極為普遍，其樹皮經搓揉後，散發出強烈之杏仁香氣。五月間發出新枝葉並開花。

(12) 小花鼠刺 Itea parviflora Hemsl.

屬於虎耳草科(Saxifragaceae)，常綠灌木或小喬木。葉互生，披針形至長橢圓形，長8—12公分，寬2.5—3.5公分，先端銳尖，基部楔形，全緣或邊緣具細小鈍鋸齒，裏面灰白色；葉柄長1—2公分。腋生聚繖花序長5公分；花密，白色。蒴果成熟後二裂。

在闊葉林中甚為普遍。

(13) 森氏楊桐 Clevera japonica Thunb. var. morii (Yamamoto) masamune

屬於茶科(Theaceae)常綠小喬木或灌木；小枝平滑，灰綠色。葉有柄，厚革質，倒卵狀橢圓形，先端鈍或銳，全緣，表面暗綠，裡面淡綠，長5—9公分，寬2—3公分。花兩性，有梗，腋出，單生或2—3朵叢生，黃白色；萼片及花瓣各為5枚；雄蕊多數；子房2—3室，柱頭3裂。漿果球形，徑約8公厘，熟時黑色。

本種在森林中零星分佈，在上磺溪上游較多。六月份開花，花帶有濃厚香氣。

(14) 大葉楠 Persea iaponica Sieb.

屬於樟科(Lauraceae)，為常綠大喬木。葉略厚，無毛，橢圓狀披針形或倒披針形，長8—12公分，寬2.5—4公分，先銳漸尖，基部楔形；葉柄長1—1.8公分。花

形成圓錐花序，花被6片，雄蕊9枚，花藥瓣裂。果為球形漿果。

在公園區內分佈於海拔較低之森林中。本種之木材淡紅褐色，保存期長，可供建築、傢俱、雕刻之用。

(15) 豬腳楠 Persea thunbergii (Sieb. & Zucc.) Kostermans

屬於樟科 (Lauraceae)，為常綠喬木。葉呈厚革質，倒卵形或倒披針狀長橢圓形，先端鈍尾狀，基部銳至楔形，表面光滑，長8—12公分，寬2.5—3.5公分，圓錐花序自枝頂葉腋抽出，無毛，基部具苞片數枚；苞片橢圓形，紅色；花被片6枚，狹橢圓形，長約6公厘，外輪略小，被有褐色；雄蕊4輪，第4輪為假雄蕊，藥4室，瓣裂。漿果球形，徑約10公厘，暗紫色，基部具有宿存而反卷之花被。

為公園區內最常見之樹種，枝端之冬芽大而明顯，外被多數鱗片。春天發出新葉及花序。在天然闊葉林中常佔據優勢，上磺溪上游即有許多高大植株。

(16) 昆欄樹 Trochodendron aralioides Sied. & Zucc.

屬於昆欄樹科 (Trochodendraceae) 為常綠大喬木，全株無毛。葉具長柄，聚生於枝端，外形多變，自闊卵形至披針狀橢圓形，長5—14公分，寬2.5—8公分，先端尾狀銳尖，基部圓鈍，邊緣有淺鋸齒。花無花被，形成總狀花序；心皮5—12枚排成一輪，其外著生數圈雄蕊。果實為蓇葖果，內藏多數種子。

本種在公園區內海拔較高處，往往形成純林，如七星山頂附近之山窪處。上磺溪上游有許多巨大的植株。其葉面富有光澤，極易分辨。花期在四月中至五月初。

五、其他常見的種類

1. 蕨類植物

(1) 過山龍 Lycopodium cernuum L.

屬石松科 (Lycopodiaceae)，為直立或匍匐性之植物，多分枝。葉片細而變曲，密佈於莖上。分枝先端能產生孢子囊穗，由孢子葉所組成；每一孢子葉產生一孢子囊。

本種喜生長於向陽光之草生地、路旁、或竹林中。

(2) 生根卷柏 Selaginella doederleinii Hieron.

屬卷柏科 (Selaginellaceae)。主莖直立，基部常匍匐狀，莖上附生許多氣生根。葉呈四列，中間二列小而密。孢子囊穗長於枝頂，由孢子囊葉所組成，孢子囊可產生大小兩種孢子。

本種之分佈甚廣，十分常見，喜生長於森林或台灣竹林下，如七星山南坡步道所經之處即有大片的生根卷柏。

(3) 全緣卷柏 Selaginella delicatula (Desv.) Alston

本種亦屬卷柏科，外形類似上種，但葉片較小，葉緣無細鋸齒。其分佈為全面性，

喜陰濕之處。

(4) 紫萁 Osmunda japonica Thunb.

屬於紫萁科 (Osmundaceae)。葉有兩型，即分為營養葉及生殖葉，兩者均為二回羽狀複葉；營養葉50—80公分高，小羽片無柄，邊緣有細鋸齒；生殖葉20—50公分高。在台灣竹林間常常可以見到。

(5) 菲律賓金狗毛蕨 Cibotium cumingii Kunze.

屬於蚌殼蕨科 (Dicksoniaceae)。根莖粗大，被覆金黃色有光澤之毛。葉三回羽裂，1.5—3公尺長，內側灰白。孢子囊群沿小羽片邊緣着生，外覆有孢膜；孢膜開裂時呈蚌殼狀。

本種在各處均可見到，尤其是山澗邊如北磺溪源頭各支流邊較多。其根莖可做裝飾品。

(6) 台灣桫欓 Alsophila spinulosa (Hook.) Tryon

屬於桫欓科 (Cyatheaceae)。樹狀之蕨類，高達5公尺。葉柄有刺，葉三回羽裂，聚生於頂。

分佈於樹下陰濕之處。

(7) 筆筒樹 Sphaeropteris lepifera (Hook.) Tryon

外形類似台灣桫欓，但葉柄上有瘤凸，且葉為脫落性，使得樹幹上留有許多葉柄斷落時所造成之疤痕。

本種在各溪谷及山凹中常多量出現，如菁山農場一帶便有成群生長。其樹幹下部黑褐色，可做蘭盆。北磺溪上游諸支流邊，常可見到。

(8) 東方狗脊蕨 Woodwardia orientalis Sw.

葉柄基部被覆大型、紅褐色之鱗片。葉身二回羽狀分裂，長可達200公分。孢子囊群長形，下陷於葉肉內，上覆孢膜。除靠孢子繁殖外，本種之葉面尚能產生許多不定芽。該不定芽脫落後能直接發育成另一植株。

本種隨處可見，特別沿公路之邊坡上。

(9) 台灣山蘇花 Asplenium nidus L.

為大型附生植物，著生於樹幹上。葉片多而叢生，長1—1.5公尺，寬10—15公分，葉背長有許多自主脈斜出而平行之孢子囊群。

本種在北磺溪上流之各溪谷中甚為常見。

2. 草本植物

(10) 七星月桃 Alpinia densespicata Hayata

屬於薑科 (Zingiberaceae)，高1—2公尺。葉披針形，長40—50公分，寬約8公分，邊緣有密毛。花序穗狀，直立，約15公分長，有金黃絨毛，花密生。花辦3枚，

下方合生；雄蕊1枚。果實圓球狀，有毛。

本種在台灣之分佈以七星山稜為多，喜生長於林下，花期自四月中旬至五月中旬。

(11) 東心蘭 Aletris spicata (Thunb.) Franchet

屬於百合科 (Liliaceae)，為多年生草本。葉基生，線形，長7—30公分，寬6—8公厘。花多數，著生於一細長花軸上，花軸長20—50公分；花被6，白色而帶紅暈。蒴果球形，外被密毛。

本種分佈於開闊草生地及路邊，四月份開花。

(12) 大屯細辛 Asarum taitonensis Hayata

屬於馬兜鈴科 (Aristolochiaceae)，為多年生草本，具根莖。葉卵狀心形，長12—15公分，寬6—8公分，先端銳形，上表面有白斑；葉柄長15—20公分。花1或2，在近地表處開放，呈倒圓錐形，先端3裂。

本種在草叢、林下極多，於四月底及五月初開花。另一外形極類似的種為裏紫細辛 (Asarum infrapurpleum Hayata)，也常見。此種之葉下帶紅紫色。

(13) 落新婦 Astilbe longicarpa (Hayata) Hayata

屬於虎耳草科 (Saxifragaceae)，為多年生具短柔毛之直立草本，高40—150公分。基生葉具長柄，多二回三出複葉，側生及頂生小葉多卵狀披針形，先端漸尖，基部心形至鈍形，長7—13公分，寬2—5公分，邊緣有雙重鋸齒。圓錐花序頂生，長30—60公分；花白色，小形；花瓣匙形。蒴果2室，成熟後自中間裂為兩半。

多分佈於路邊，四月下旬開始開花。

(14) 台灣秋海棠 Begonia formosana (Hayata) Masamune

屬於秋海棠科 (Begoniaceae)，為多汁之草本植物，具有匍匐根莖。葉歪卵形，長約15公分，寬約8公分，有長柄，先端銳尖，基部歪心形，邊緣有不規則鋸齒。花軸長，先端形成聚繖花序。花雌雄同株；雄花淡紅色，4瓣；雌花5瓣。蒴果具有3翅。

本種多分佈於林下陰濕之處，自五月起開花直至秋天。

(15) 山菅蘭 Dianella ensifolia (L.) DC. ex Red.

屬於百合科 (Liliaceae)，為多年生草本。葉革質，下方互為層疊，披針形或劍形，長40—50公分，寬3—5公分，先端漸尖。花軸長100公分，花序圓錐形；花藍紫色，由6瓣合成，排成2輪；雄蕊6枚，花藥黃色。果為球狀漿果。

本種分佈於草生地，極似蘭花，但其花不具唇瓣。花期自五月開始。

(16) 南國薊 Cirsium iaponicum DC. var. australe Kitamura

屬於菊科 (Compositae)，為多年生草本，高可達1公尺；莖多分枝，有毛。基生葉長橢狀披針形，長15—30公分，邊緣羽狀深裂，附有極尖銳之刺。頭狀花序頂生，圓球形，徑4—5公分，由1—3葉片所包圍；花序外緣有6—7圈之苞片所被覆；

花冠淡紫紅色。瘦果長橢圓形，上端有一圈冠毛。

本種在路旁極多，花相當美麗，自四月下旬便開始開放，花期甚長。

(17)小毛氈苔 Drosera spathulata Lab.

屬於茅膏菜科 (Droseraceae)，為無莖，帶紅褐色之小草本。葉基生，匙形，長1—2公分，葉面密生腺毛。花軸1—4，長可達15公分。花序總狀；花小，紅色，5瓣。

本種葉面腺毛能分泌粘液，為食蟲植物之一種。路旁坡面及風化之岩石上往往有成群分佈，特別在七星山四周，隨處可見。花自五月起開放。

(18)台灣龍胆 Gentiana atkinsonii Burk. var. formosana (Hayata) Yamamoto

屬於龍胆科 (Gentianaceae)，為多年生草本；莖叢生，高5—10公分。葉單脈；基生葉線狀披針形或狹披針形，長1.5—4公分，寬2—6公厘；莖生葉較短。花單生或2—4朵聚生枝端；花冠鐘狀筒形，藍色，長15—23公厘，先端淺5裂。蒴果長橢圓形，長1公分，成熟時二裂。

本種之主要分佈地為中央山脈海拔3000公尺左右之高山草生地及玉山矢竹林間。但在陽明山國家公園區內，海拔800公尺之草生地或路旁即可發現，如大屯山及七星山鞍部附近。

(19)六角定經草 Mazus pumilus (Burm. f.) Steenis

屬於玄參科 (Scrophulariaceae)，為直立之一年生草本。葉多聚生基部，倒卵形至倒卵狀長橢圓形，長2—6公分，寬8—15公厘，先端圓，邊緣有鈍齒。花軸1至數枝；花淡紫色至白色，長1公分左右，唇形。蒴果圓球形。

分佈於路邊草地，多成群生長，花期甚長。

(20)七葉一枝花 Paris polyphylla Smith

屬於百合科 (Liliaceae)，為多年生草本；根莖短而粗；莖單枝直立，高可達1公尺。葉6—8，輪生於枝端，長橢圓形至卵狀長橢圓形，長15—30公分，寬8—10公分，先端漸尖，基部鈍形。花獨生，具3—5公分長之梗。花被裂片8—10，排成二圈；外圈裂片之形狀與葉片相似，內圈裂片則呈線形；雄蕊5—6。果為漿果。

本種散生於闊葉林下，於四月間開花。其塊根為民間常用藥材，一名七葉蓮，用以治療蛇傷及癌症。

(21)姜荳 Polygonatum cyrtonema Hua

屬於百合科 (Liliaceae)，為多年生草本；根莖發達，扁球形；莖單生，光滑，高可達1.5公尺。葉披針形至長橢圓披針形，長12—18公分，寬2—3.5公分，先端銳形，基部鈍形。花2—4或數朵形成繖形花序，自每一葉腋長出，下垂；花被筒狀，先端6裂，黃白色。果實為球形漿果。

本種分佈於闊葉林或台灣竹林下，四、五月間開花，可做為盆栽觀賞植物。其根莖稱為黃精，可供藥用。

(22) 夏枯草 Prunella vulgaris L.

屬於唇形花科 (Labiatae)，為小草本植物，全株有毛。葉卵形，有柄，葉身長4—6公分，先端銳形，基部楔形至圓形。密集之輪繖花序聚生於莖頂而形成總狀花序般的，每一聚繖花序被一葉狀苞片所包圍；花萼漏斗狀；花冠筒狀，紫紅色至白色，先端分裂成二唇。

本種多分佈於路旁草地上，花期自四月中旬至六月。夏末以後即枯萎。其花序及莖葉均可供藥用，十分普遍。

(23) 台灣唐松草 Thalictrum fauriei Hayata

屬於毛茛科 (Ranunculaceae)，為多年生草本，高可達45公分。葉多為三出複葉或2—3回三出二回羽狀複葉；小葉倒三角形，先端5裂。花小，頂生，單獨或形成聚繖花序；萼片4—5，白色；無花瓣；雄蕊數目極多；心皮多數，離生。瘦果小，先端倒彎。

本種多分佈於路旁，四月起開花。

(24) 台北堇菜 Viola nagasawai Makino & Hayata

屬於堇菜科 (Violaceae)，為無莖之小草本。葉基生，具有3—4公分長之葉柄；葉身卵圓形，長1—2.5公分，寬8—20公厘，先端圓形，基部闊心形，邊緣齒狀，上面有毛；葉柄上方翼狀。花梗6—10公分長；花單生，具有5倒卵形之花瓣，其中下方一瓣較短，有距。果為三裂蒴果。

本種分佈於路旁，常成群生長。四月起開花，花似蝴蝶，小巧而美麗。

(25) 小二仙草 Haloragis micrantha (Thunb.) R. Br.

屬於小二仙草科 (Haloragaceae)，為直立多年生之草本植物。葉多對生，橢圓形或卵形，長6—10公厘。圓錐花序鬆散，頂生；萼片及花瓣均為4枚，雄蕊8枚。

本種分佈於向陽之處。

(26) 七星山穀精草 Eriocaulon chishingsanensis Chang

屬於穀精草科 (Eriocaulaceae)，為一年生無莖之草本植物。葉叢生，線狀披針形，長4—5公分。圓球狀頭狀花序着生於一長4—9公分之柄端；雌雄同株，萼片及花瓣各為3枚，雄蕊6枚。

本種分佈於夢幻湖四周。

(27) 草薺 Eleocharis dulcis (Burm. f.) Triniius ex Henschel

屬於莎草科 (Cyperaceae)，為多年生草本植物，具球莖。稈多數叢生，高40—80公分，圓形而具橫隔，其基部包有少數紅褐色之鞘。密集之穗狀花序着生稈端，長2

— 5 公分，外被有穎。

本種多分佈於夢幻湖，大尖後山及礦嘴山間之沼澤地區。

(28) 水毛花 Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla subsp. robustus (Miq.) T. Koyama

屬於莎草科，稈叢生，高45—130公分，但不具橫隔，其基部亦有鞘。花序自稈之上方 $\frac{1}{3}$ 處側生，由5—20卵狀之小穗所組成。

本種之分佈區如荸薺，在夢幻湖處常被誤認為水葷。

2. 木本植物

(1) 尖葉槭 Acer kawakamii Koidz.

屬於槭樹科 (Aceraceae)，為落葉喬木。葉對生，卵形，有時作3或5淺裂，長5—7公分，寬4—5公分，先端長尾狀銳尖，基部心形，邊緣有不齊鋸齒。果為扁平翅果。

本種零星分佈於各處，在接近礦嘴山及大尖山分叉路口 (818峯) 處有一小片純林。到秋季，葉片轉變成黃色，十分美麗。

(2) 青楓 Acer serrulatum Hayata

屬於槭樹科 (Aceraceae)，為落葉喬木。葉外緣圓形，長7—8公分，寬9—10公分，掌狀五裂，邊緣有鋸齒。翅果長約2.5公分。

各處零星分佈，十二月間葉片轉變成深紅色或橙紅色，在叢綠中，十分耀眼。

(3) 台灣獮猴桃 Actinidia callosa Lindl. var. formosana Finet & Gagnep.

屬於獮猴桃科 (Actinidiaceae)，為攀緣性灌木。葉互生，卵形至長橢圓形，長6—14公分，先端銳尖，基部圓鈍，邊緣有鋸齒；葉柄長2—5公分，帶紅色。聚繖花序腋出，花少數。漿果倒卵形，長3—4公分，外表具灰褐色皮孔。

本種多分佈於芒草原上，果可食用。

(4) 假赤楊 Alniphyllum pterospermum Matsum.

屬於安息香科 (Styracaceae)，為灌木或小喬木，全株幼嫩部分被有星狀毛。葉卵狀長橢圓形，長6—13公分，先端漸尖，基部鈍形，邊緣有細鋸齒；葉柄長1—1.5公分。圓錐花序頂上；花冠白色，深5裂；雄蕊10枚，花絲連生成筒狀。蒴果長橢圓形。

分佈於向陽之處。

(5) 樹杞 Ardisia sieboldii Miq.

屬於紫金牛科 (Myrsinaceae)，為常綠小喬木，幼嫩部位被有褐色鱗片。葉聚生枝頂，倒披針形，長7—15公分，先端鈍，基部銳，全緣。繖形花序簇形成繖房狀，頂生或腋生；花冠白色或淡紅色；雄蕊5枚，着生冠筒基部。

分佈廣泛，各處可見。

(6) 桃葉珊瑚 Aucuba chinensis Benth.

屬於四照花科 (Cornaceae)，為常綠灌木。葉對生，披針狀長橢圓形，長10—12公分，兩端均銳，邊緣具疏粗鋸齒。花雌雄異株，形成圓錐花序；花瓣4枚。核果橢圓形，熟時變紅。

分佈於林下陰暗處，以北磺溪一帶為多。

(7) 山紅柿 Diospyros morrisiana Hance

屬於柿樹科 (Ebenaceae)，為小喬木。葉革質，長橢圓形，長6—10公分，寬2—4公分，先端漸尖，基部銳尖，全緣。花黃白色，鐘形或壺形，4裂。漿果球形，黃褐色。

本種在七星山南坡之闊葉林中甚多。

(8) 山豆根 Euchresta formosana (Hayata) Ohwi

屬於豆科 (Leguminosae)，為常綠灌木。葉互生，為奇數羽狀複葉；小葉7—9，對生，長橢圓形，長8—10公分，先端尾狀銳尖，全緣。總狀花序頂生，花瓣淡紫色。果為漿果。黑色。

在北磺溪上游一帶較多，其根可為藥用。

(9) 野鴨椿 Euscaphis japonica (Thunb.) Kanitz

屬於省沽油科 (Staphyleaceae)，為小喬木。葉對生，奇數羽狀複葉；小葉2或3對，卵形至卵狀橢圓形，長5—8公分，寬3—4公分；先端銳尖，基部圓鈍，邊緣有微小鋸齒。花小，聚成圓錐花序。果實1—3聚在一起，成熟時變紅，十分美麗，開裂後露出黑色的種子。

公園區內可說是本種的主要產地，其他地區也僅台北盆地東側山區有少數分佈。

(10) 假柃木 Eurya crenatifolia (Yamamoto) Kobuski

屬於茶科 (Theaceae)，為常綠灌木，小枝有毛。葉小，倒卵狀長橢圓形至橢圓形，長1—1.5公分，寬0.5—1公分，細鈍鋸齒緣。花2—3朵腋出。果小，扁球形。

本種多分佈於草生地。

(11) 華八仙 Hydrangea chinensis Maxim.

屬於虎耳草科 (Saxifragaceae)，類似狹瓣八仙花，所不同的為本種全株無毛，枝條常帶紫黑色，葉片革質，葉緣之鋸齒細小而呈腺尖狀。

本種多分佈於森林下面，花朵於四月份盛開，與櫻花爭奇鬥艷。

(12) 燈籠花 Ilex asprella (Hook. & Arn.) Champ.

屬於冬青科 (Araliaceae)，為落葉性灌木。葉紙質，卵形，長3—5公分，寬1.5—2公分，先端銳尖，基部鈍形或楔形，葉緣有細小鋸齒。花小，白色，腋出，具

細長花梗。果為核果，熟時轉變成黑色。

本種在森林或路邊隨處可見，五月間開花。開花時，每一葉腋長一至數朵，小巧玲瓏，因此又稱為萬點金。

(13) 九芎 Lagerstroemia subcostata Koehne

屬於千屈菜科 (Lythraceae)，為落葉性大喬木，樹皮茶褐色，光滑，但老樹之樹皮呈剝離狀。葉近對生，卵形至長橢圓形，長3—8公分，寬2—3公分，先端銳，基部圓鈍。圓錐花序頂生，花密生；花瓣6枚，黃白色，邊緣皺褶，具一細長柄。果為蒴果。

本種在上磺溪上游之闊葉林中頗多，且多大樹，六月間開花。

(14) 楓香 Liquidambar formosana Hance

屬於金縷梅科 (Hamamelidaceae)，為落葉大喬木。樹脂具蘇合香之芳香。葉有長柄，互生而叢集枝端，菱形，基部心形，3裂，裂片先端尖銳，細鋸齒緣，長10—12公分，兩面平滑。雌雄同株；雄性頭狀花序成短總狀排列，雌性頭狀花序單生；花淡黃綠色，無花被，惟具刺狀小鱗片。蒴果互相癒合而成頭狀之聚合果，徑約2.5公分。

本種樹形美觀，多栽植為庭園樹及行道樹，如陽明山車站、公園一帶之路旁即是。上磺溪上游一帶，有多數天然生長之大樹分佈，其樹榦常被用以栽植香菇。

(15) 鹿皮斑木薑子 Litsea orientalis Chang

屬於樟科 (Lauraceae)，為常綠小喬木。葉互生，長橢圓形，長4.5—9公分，革質，兩端鈍形，幼葉略帶毛絨；葉柄長6—15公厘。花腋出，3朵排成繖形花序；花雌雄異株，花被6枚，雄蕊9枚。果球形，成熟變紫黑色。

本種在中興農場一帶較多。

(16) 金銀花 Lonicera japonica Thunb.

屬於忍冬科 (Caprifoliaceae)，常綠小藤本，全株幼嫩部分密被黃褐色絨毛。葉對生，卵形至橢圓形，長3—8公分，寬2—3公分，先端銳形或作短突，基部圓形或近心形。花唇形，成對生長，初色白而帶紫暈，後變黃色，因此稱為金銀花。果為漿果。熟時轉變成黑色。

本種在公園區內頗常見，於五月開花，黃白相間，十分顯目。金銀花為著名之藥材，可作為利尿劑，且具抗生性，對腸痢及諸化膿性疾患均有效，此外亦為芳香健胃、清火解毒良品，近年來常用於癌症。

(17) 野牡丹 Melastoma candidum D. Don

屬於野牡丹科 (Melastomataceae)，為常綠小灌木，莖略呈方形；嫩枝、葉、及花萼均密被淡褐色倒伏狀之剛毛。葉對生，橢圓形至卵圓形，長5—12公分，寬2—6公分，具3—5條掌狀脈。花大，淡紫紅色，3—7朵成頂生聚繖花序。果為壺狀，肉

質，外被褐色剛毛。

本種最為常見，多分佈於見陽之草生地上及路旁邊坡上，夏初開花，十分美麗。夢幻湖畔亦有一種開藍（紫）色花之野牡丹，該種為外國引進種。

(18)台灣山桂花 Maesa tenera Mez

屬於紫金牛科（Myrsinaceae），為常綠灌木，全株無毛。葉互生，橢圓形至長橢圓形，長6—13公分，寬3—5公分，先端銳或鈍，基部圓鈍，具波狀鋸齒緣。總狀或複總狀花序腋生，花白色，小，呈漏鐘形。

分佈於森林內，極為普遍。四、五月開花，小而略帶香味。

(19)銳葉楊梅 Myrica rubra Sieb. & Zucc. var. acuminata Nakai

屬於楊梅科（Myricaceae），多為小喬木。葉具短柄，螺旋狀排列，叢集枝端，倒披針形，或倒卵至橢圓形，長5—7公分，寬2—2.5公分；葉緣全緣，或上部鋸齒緣。雌雄異株，花為葇荑花序，無花被，雄花有苞2片，小苞3—4片，雄蕊6—8枚；雌花亦具苞及小苞，子房一室，花柱2歧。核果球形，徑約1.5公分，亦有大至3公分者，外具多汁之突起，初時綠色，熟時轉為暗紅色。

本種在森林中常可遇見，四月初開花。因花粉量多，因此散落後樹下之土素往往被染成黃色。果實在六月成熟，味酸，可供食用。

(20)五掌楠 Neolitsea konishii (Hayata) Kanehira & Sasaki

屬於樟科（Lauraceae），為大喬木。葉革質，倒披針形，聚生於枝頂，長11—18公分，先端突尖，基部楔形，全緣，葉柄長1—1.5公分。花雌雄異株，聚生於枝上形成數團；花被4，雄蕊6，漿果橢圓形。

在闊葉林中十分普遍。

(21)小葉石楠 Photinia parvifolia (Pritz.) Schneider

屬於薔薇科（Rosaceae），為落葉性小喬木或灌木。葉互生，橢圓形至倒卵形，長2—4公分，寬1—2公分，先端銳形，基部楔形，葉緣有鋸齒，上表面有毛。花聚成頂生繖房花序，有毛；花瓣白色，基部有短柄。果實卵狀，成熟時轉變成紅色。

分佈於草生地，竹林中，五月間開花。

(22)山櫻花 Prunus campanulata Maxim.

屬於薔薇科（Rosaceae），為落葉性喬木。葉卵形至倒卵狀橢圓形，先端突銳尖，基部為鈍形或近於圓形，腺狀重鋸齒緣，長7—12公分，寬3—5公分；托葉線形，剪裂狀；葉柄長約2—3公分，上端具有腺體2枚。花先葉開放，常3—5朵簇生於葉痕之上部，下垂性，基部具苞片1對；萼鐘狀漏斗形，先端5裂，紅色；瓣片先端呈凹形，半開狀，緋紅或暗紫紅色；雄蕊20枚。核果橢圓形，長約1.6公分，熟時紅色。

本種主要供觀賞，陽明山各地大量栽植，每年三月份盛開。

(23) 台灣藤漆 Rhus orientalis (Green) Schn.

屬於漆樹科 (Anacardiaceae)，為藤本植物。葉為三出複葉；頂小葉倒卵狀長橢圓形，先端銳尖；側生小葉長橢圓形。總狀花序腋出，花各部均為5數。核果外表具短刺毛。

本種為有毒植物，喜攀附於昆欄樹上，因此在七星山近頂處較多。

(24) 鵝掌柴 Schefflera octophylla (Lour.) Horns

屬於五加科 (Araliaceae)，為喬木。葉為掌狀複葉，小葉6—11枚，長橢圓形，長10—12公分，全緣，有時作不規則缺裂。繖形花序常形或圓錐形；花小，綠白色，花瓣5枚。核果球形。

各處均有分佈。

(25) 灰木 Symplocos paniculata (Thunb.) Miq.

本種屬於灰木科 (Symplocaceae)，為落葉小灌木，嫩枝、葉及花序均生有毛。葉具短柄。橢圓形或倒卵形，先端銳，基部鈍，腺狀鋸齒緣，長3—7公分，寬2—3.5公分，表面深綠色，老葉裏面有毛。圓錐花序頂生，密花；萼鐘形，有毛，5裂；花冠白色，徑約0.8公分，深5裂，裂片橢圓形；雄蕊多數，花絲細長；子房半下位。果實歪卵形，徑約5公厘，熟時黑色。

本種零星分佈於各處，花期自五月初開始。

(26) 鳥皮九芎 Styrax formosana Matsum.

屬於安息香科 (Styraceae)，為落葉性灌木或小喬木，全株幼嫩部份密被星狀毛茸。葉倒卵狀橢圓形至長橢圓形，長4—6公分，寬2—3公分，先端突銳尖，基部楔形。花下垂，4—8朵形成總狀花序或聚繖花序；花冠白色，深5裂，長1.2公分；雄蕊10枚。蒴果卵形，灰綠色。

本種於各處零星分佈，四月中開花。

(27) 紅子英 Viburnum luzonicum Rolfe var. formosanum (Hance) Rehder

屬於忍冬科 (Caprifoliaceae)，為灌木或小喬木，幼嫩部分被有星狀毛。葉對生，闊卵形，長6—12公分，寬3—5公分，先端銳尖，基部圓鈍，邊緣具淺鋸齒。花多而密，形成頂生聚繖花序；花冠白色，合瓣；雄蕊5枚。核果球形，熟時呈紅色。

本種自四月中旬開花，果實成熟後十分美麗。

(28) 牛奶榕 Ficus erecta Thunb. var. beecheyana (Hook. & Arn.) King

屬於桑科 (Moraceae)，為半落葉性小喬木，全株被有褐色毛茸。葉互生，紙質，長倒卵形，或長橢圓形，先端突尖，基部圓形，全緣或邊緣為波狀，長12—8公分，寬7—9公分，側脈6—7對，略為粗糙，表面暗綠色，裏面灰白色。隱花果腋出，單立，球形，徑約1.5公分，有毛，熟時橙紅色。

本種具有白色乳汁，易於區別。公園區內各處均有其踪跡。四月發出新葉，略帶紅褐色，同時亦長出隱花果。

A black and white photograph of a handwritten document from 1912. The page is filled with dense cursive handwriting. Several circular red seals are stamped across the text, notably one at the top right and another near the bottom left. The paper shows signs of age and wear.

肆、植被景觀

本區之植被可明顯地區分為水(濕)生植被，草原植被及森林植被三大類。每一類復因其內部組成之差異而劃分為不同的植物社會。每一植物社會均附有一典型樣區之調查表。表內記載了樣區地點、海拔、面積、植物社會層次、各層次之概略高度、及各層次組成種類之名稱、被覆度、及群居性。其中被覆度分為六級：

5：佔調查面積的 75 - 100 %

4 : 50 - 75 %

3 : 25 - 50 %

2 : 10 - 25 %

1 : 3 - 10 %

+ : 覆蓋面積小於 3 %

群居性是指同一種植物在一個樣區內的親和情形，亦分為六級：

5 : 在調查區內呈地毯狀

4 : 在調查區內呈大群斑紋狀

3 : 在調查區內呈小群斑紋狀

2 : 在調查區內呈小群狀

1 : 在調查區內呈聚生狀

+ : 在調查區內呈單生狀

一、水(濕)生植被

此群植被分佈有限，僅見於貯水池、火山口沼澤地、及廢棄之水稻田，構成不連續的植群。以下就夢幻湖、向天池及磺嘴山一大尖後山沼澤區分別敘述如下：

1.夢幻湖沼澤區

位於七星山東南鞍部，海拔約 850 公尺。自從台灣水韭 (*Isoetes taiwanensis*) 發現後，即轟動各界，現為有名的風景區及學術研究區。本區終年積水，湖底腐殖質深厚、植物濃密，顯示本區發育已有相當長的歷史。夢幻湖為台灣水韭的唯一生育地，由地下孢粉分析知，長久以來台灣水韭即為此湖最優勢的浸水植物。現今除了台灣水韭佔據大部份水域外七星山穀精草 (*Eriocaulon chishingsanensis*) 亦為主要浸水植物之一，挺水植物主要有水毛花 (*Schoenoplectus mucroxatus* subsp. *robustus*)、茅蘚 (*Eleocharis dulcis*)、金銀蓮花 (*Nymphoides indica*)，岸邊水可漫到區域以蓆薹 (*Sphaecrocaryum malaccense*)、燈心草 (*Iuncus effusus*)、針蘭 (*Elaeocharis congesta* var.

japonica)、錢蒲(Juncus leschenaultii)及柳葉箬(Isachne globosa)。湖岸則有印度鴨嘴草(Ischaemum indicum)、芒草(Misanthus spp.)、雀稗(Paspalum thunbergii)、及地毯草(Axonopus compressus)等禾本科植物，同種植物大多叢聚生長。代表樣區如表一所示。

夢幻湖因是各方注目之焦點，以下特將湖中及湖旁的植物種類列舉出來：

- Lycopodiaceae 石松科
 (1) Lycopodium cernuum L. 過山龍
- Isoetaceae 水葦科
 (2) Isoetes taiwanensis DeVol 台灣水葦
- Gleichenlaceae 裹白科
 (3) Dicranopteris linearis (Burm. f.) Under 芒萁
 (4) Diplopterygium glaucum (Houtt.) Nakai 裹白
- Dennstaedtiaceae 碗蕨科
 (5) Dennstaedtia scabra (Wall.) Moore 碗蕨
 (6) Histiopteris incisa (Thunb.) J. Sm. 栗蕨
- Lindseaceae 陵齒蕨科
 (7) Sphenomeris chusana (L.) Copel 烏蕨
- Thelypteridaceae 金星蕨科
 (8) Christella acuminata (Houtt.) L'ev. 小毛蕨
- Taxodiaceae 杉科
 (9) Cryptomeria japonica (L. f.) D. Don 柳杉
- Polygonaceae 蓼科
 (10) Polygonum chinense L. 清飯藤
- Lauraceae 樟科
 (11) Persea thunbergii (Sied. et Zucc.) Kostermans 紅楠(豬腳楠)
- Trochodendraceae 昆欄樹科
 (12) Trochodendron aralioides Sieb. et Zucc. 昆欄樹
- Aristolochiaceae 馬兜鈴科
 (13) Asarum taitonensis Hay. 大屯細辛
- Theaceae 茶科
 (14) Camellia tenuifolia (Hay.) Chen-Stuart 細葉山茶
- (15) Eurya crenatifolia (Yamamoto) Kobuski 假柃木

表一 夢幻湖水生植物社會

地點	夢幻湖
海拔	850 M
面積	3 × 3 M ²
草本層 (25cm)	
覆蓋度	群居性
4 5	台灣水葦
4 4	七星山穀精草
2 3	蔴蓋
1 2	茅薺
1 1	針蘭
1 1	燈心草
++	雀稗
++	錢蒲

Guttiferae 金絲桃科

(16) Hypericum japonicum Thunb. ex Murray 地耳草(小還魂)

Hamamelidaceae 金縷海科

(17) Liquidambar fomosana Hance 楓香

Saxifragaceae 虎耳草科

(18) Hydrangea angustipetala Hay. 狹瓣八仙花

Rosaceae 蘆薇科

(19) Rubus taiwanianus Matsum. 刺莓

(20) Rubus shinkoensis Hay. 變葉懸鈎子

Euphorbiaceae 大戟科

(21) Mallotus japonicus (Thunb.) Muell.-Arg. 野桐

Aquifoliaceae 冬青科

(22) Ilex asprella (Hook. & Arn.) Champ. 燈籠花(烏骨雞)

Staphyleaceae 省沽油科

(23) Euscaphis japonica (Thunb.) Kanitz 野鴨椿

Vitaceae 葡萄科

(24) Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep. 虎葛

Melastomataceae 野牡丹科

(25) Melastoma candidum D. Don 野牡丹

Haloragaceae 小二仙草科

(26) Haloragis micrantha (Thunb.) R. Br. 小二仙草

Umbelliferae 繖形花科

(27) Centella asiatica (L.) Urban 雷公根

(28) Hydrocotyle sibthorpioides Lam. 天胡荽

Rhododendraceae 杜鵑花科

(29) Gaultheria leucocarpa Blume forma cumingiana (Vidal) Sleumer 白珠樹

(30) Rhododendron nakaharai Hay. 中原氏杜鵑

Gentianaceae 龍膽科

(31) Gentiana atkinsonii Burk. var. formosana (Hay.) Yamamoto 台灣龍膽

Scrophulariaceae 玄參科

(32) Torenia concilar Lindly var. formosana Yamazaki 倒地蜈蚣

Plantaginaceae 車前科

(33) Plantago major L. 大車前草

Liliaceae 百合科	玉簪花	三葉	山管蘭	二葉
(34) <u>Dianella ensifolia</u> (L.) DC. ex Redoute.	桔梗蘭 (山管蘭)			
Pontederiaceae 雨久花科				
(35) <u>Monochoria vaginalis</u> (Burm. f.) Presl	鴨舌草			
Juncaceae 燈心草科				
(36) <u>Juncus effusus</u> L. var. decipiens Buchen	燈心草			
(37) <u>Juncus leschenaultii</u> Gay ex Lapharpe	錢蒲			
Eriocaulaceae 穀精草科				
(38) <u>Eriocaulon chishingsanensis</u> Chang	七星山穀精草			
Cyperaceae 莎草科				
(39) <u>Eleocharis congesta</u> D. Don subsp. <u>japonica</u> (Miq.) T. Koyama	針蘭			
(40) <u>Eleocharis dulcis</u> (Burm. f.) Trin. ex Henschel	茅薺			
(41) <u>Schoenoplectus mucronatus</u> (L.) Palla subsp. <u>robustus</u> (Miq.) T. Koyama				
水毛花				
Gramineae 禾本科				
(42) <u>Agrotis sozanensis</u> Hay. 草山翦股颖				
(43) <u>Axonopus compressus</u> (Sw.) P. Beauv. 地毯草				
(44) <u>Isachne globosa</u> (Thunb.) Ktze. 柳葉箬				
(45) <u>Ischaemum indicum</u> (Houtt.) Merr. 印度鷓嘴草				
(46) <u>Misanthus floridulus</u> (Labill.) Warb. ex Schum. & Laut. 五節芒				
(47) <u>Misanthus sinensis</u> Anders. var. <u>formosanus</u> Hack. 台灣芒				
(48) <u>Paspalum thunbergii</u> Kunth ex Steud. 雀稗				
(49) <u>Paspalum dilatatum</u> Poir. 毛花雀稗				
(50) <u>Sacciolepis indica</u> (L.) Chase 穗顎草				
(51) <u>Sphaerocaryum malaccense</u> (Trin.) Pilger 蒜薹				

2. 磺嘴山一大尖後山沼澤區

本區係石嶺，磺嘴山和大尖後山所包圍的狹長谷地，縱深約五百公尺，區內溝畦縱橫，為一廢棄的水稻田，現今為放牧的牛隻踐踏，植物生長零散。莎草科植物如水毛花、針蘭、燈心草及李氏禾 (*Leersia hexandra*) 散生水邊或叢簇，浸水植物則為連萼穀精草 (*Eriocaulon buergerianum*)、錢蒲及水豬母乳 (*Rotala rotundifolia*)；其他伴生植物有心葉母草 (*Vandelia cordifolia*)、蒜薹、天胡荽、雷公根等。表(二)為代表樣區。其他貯水池、灌溉溪流之植被大多類似此種組成。

植物以清飯藤、懸鈎子屬(Rubus)等為主。表七為代表樣區。

(2)台灣矢竹社會

以背風的坡面及谷地或平緩的坡面為生育地，高度一至二公尺，地下莖錯雜，形成綿密的群落，結構緊密，為本山區特有的景觀。林下植物則以阿里山赤車使者(Pellionia arisanensis)，台灣山菊(Farfugium japonica var. formosana)、寒莓、台灣百兩金(Ardisia crispa var. dielsii)、狹瓣八仙花為主。代表樣區如表八所示。

2.破壞地草原社會

原有植被被破壞後所形成的草原，依其外觀可區分為低矮的放牧區草原社會和高大的五節芒草原社會兩種。

(1)放牧區草原社會

分佈於七星山以東至礦嘴山，並向頂山山列延伸。由於牛隻的啃食、踐踏，形成一片低平而色澤濃綠的氈狀草原。其組成以地毯草為主、間或夾雜印度鴨嘴草，伴生植物則有雷公根、倒地蜈蚣、天胡荽等。代表樣區如表九。

(2)五節芒草原社會

主要分佈於廢棄地，如廢棄的果園，旱作地和砍伐地。五節芒植株高大、雜亂。其下伴生清飯藤、雷公根、懸鈎子屬植物，野小毛蕨(Christella dentata)、熱帶鱗蓋蕨(Microlepia speluncae)等，如表十所示。

在上述的草原間常可見到散生的灌木植物社會，尤其是在芒草叢中。該社會以假柃木為優勢種，其他如野牡丹、狹瓣八仙花、刺莓、小花鼠刺、桔梗蘭、芒箕、裏白及拔葜等亦屬常見(表十一)。

三、森林植被

森林佔本區的絕大部份，是最重要的植被，其分佈以海拔五百公尺至九百公尺為主。主要的組成分子為樟科植物，其中尤以紅楠及大葉楠(Persea japonica)為林中之最優勢種。其他樟科植物如長葉木薑子(Litsea acuminata)、大香葉樹(Lindera megaphylla)、香葉樹(Lindera communis)、變葉新木薑子(Neolitsea variabilima)、五掌楠(Neolitsea konishii)則偶而可見。樟科以外的樹種如樹杞(Ardisia sieboldii)、小花鼠刺(Itea parvifolia)、墨點櫻桃(Prunus phaeosticta)、楓香、山紅柿(Diospyros morrisiana)、楊桐(Cleyera japonica)等在林冠上層亦佔有相當份量。至於殼斗科(Fagaceae)的長尾桐(Castanopsis carlesii)、錐果櫟(Cyclobalanopsis longinrix)、青剛櫟(Cyclobalanopsis glauca)、糙子櫟(Cyclobalanopsis acuta var. paucidentata)、等種類，數量並不多。第二層樹冠主要由米碎柃木(Eurya chinensis)、江某(Schefflera octophylla)、台灣杞李蕕(Dendropanax pellucido-punctatus)、銳葉柃

表七 台灣芒植物社會

地點 大屯主峯			
海拔 1070 M			
面積 3 × 3 M ²			
灌木層 (2M)		草本層 (50cm)	
覆 蓋 度 性	群 居 性	種 類	覆 蓋 度 性
5 5	台灣芒	1 1 冷飯藤 1 1 虎婆刺 ++ 寒梅	

表九 放牧區草原社會

地點 石梯嶺—磺嘴山			
海拔 800 M			
面積 3 × 3 M ²			
草本層 (20cm)			
覆 蓋 度 性	群 居 性	種 類	
4 5		地毯草	
3 4		印度鴨嘴草	
2 2		雷公根	
1 1		短葉水蜈蚣	
1 1		天胡荽	
1 +		芒草	
++		倒地蜈蚣	
++		叢類草	

表八 台灣矢竹植物社會

地點 七星山頂下方			
海拔 1050 M			
面積 3 × 3 M ²			
灌木層 (2M)		草本層 (50cm)	
覆 蓋 度 性	群 居 性	種 類	覆 蓋 度 性
5 5	台灣矢竹	2 3 阿里山赤車使者 1 1 台灣百兩金 ++ 台灣山薑 ++ 冷飯藤	

表十 五節芒草原社會

地點 中興農場			
海拔 825 M			
面積 3 × 3 M ²			
灌木層 (2.5M)			草本層 (1M)
覆 蓋 度 性	群 居 性	種 類	覆 蓋 度 性
5 5	五節芒	2 1 冷飯藤	
++	冷飯藤	1 1 野小毛蕨	
		1 1 雷公根	
		1 1 牛膝	
		1 1 刺莓	
		++ 热帶鱗蓋蕨	
		++ 長梗紫麻	
		++ 台灣澤蘭	
		++ 山薑	

木 (Eurya acuminata)、牛乳榕 (Ficus erecta var. beecheiana)、山龍眼 (Helicia formosana)、台灣山香圓 (Turpinia formosana) 等所構成。狹瓣八仙花、長梗紫麻 (Villebrunea pedunculata)、山桂花 (Maesa japonica)、台灣山桂花 (Maesa tenera)、燈籠花 (Ilex asprella) 為灌木層的主要樹種。林下草本植物在接近草原者以台灣矢竹、芒草為主；在潮濕地區則為冷清草 (Elatostema lineolatum)、潤葉樓梯草 (E. edule)、圓果秋海棠 (Begonia hayatae) 及冷水麻屬 (Pilea) 等植物；溫度適中者則由卷柏屬 (Selaginella)、鱗毛蕨屬 (Dryopteris)、複葉耳蕨屬 (Arachniodes)、雙蓋蕨屬 (Diplazium) 及山月桃 (Alpinia intermedia) 等植物所構成。藤本則以胡頹子屬 (Elaeagnus)、懸鉤子屬 (Rubus)、菝葜屬 (Smilax)、風旗 (Piper kadsura)、柃樹藤 (Psychotria serpens)、五爪龍 (Cayratia japonica)、台灣常春藤 (Hedera rhombea var. formosana) 等較為常見。附生植物有抱樹蕨 (Lemnomyllum microphyllum)、波氏星蕨 (Microsorium buergerianum)，及潮濕森林內的台灣山蘇花 (Asplenium nidus) 着生於樹幹上。

處於早期消長階段的森林則以昆欄樹、尖葉槭 (Acer insulare) 及長梗紫麻等較易形成明顯而大片之純林狀態。其中昆欄樹林多分佈於七星山海拔一千公尺左右的凹谷中，為草原所包圍。以尖葉槭為主的森林分佈於石梯嶺與磺嘴山間，長梗紫麻之純林則生長在竹子山麓滿佈岩石的小山谷中。

現將主要的森林社會分述如下：

(1) 尖葉槭社會

石梯嶺、磺嘴山間二次消長的早期森林係以尖葉槭為優勢種。林下稀疏，由死去的芒

表十一 灌木植物社會

地點：大尖山—818峰				
海拔 780 M				
面積 5 × 5 M ²				
灌木層 (1.5M)		草本層 (50 cm)		
覆 蓋 度	群 居 性	種 類	覆 蓋 度	
3	2	假柃木	2	密葉卷柏
3	2	芒萁類	2	雷公根
3	1	菝葜類	1	柳葉箬
2	2	芒草	+ 1	小二仙草
2	2	裡白	++	台灣長春藤
1	2	草山翦股穎	++	求米草
1	1	三葉爬崖藤	++	烏蕨
1	1	小花鼠刺	++	爵床
1	1	南國薊	++	山薑
1	1	雞屎藤		
1	+	狹瓣八仙花		
1	+	米碎柃木		
+	+	野牡丹		
+	+	牛乳榕		
+	+	刺莓		

箕、五節芒及幼齡的尖葉槭得知其成林不久。而樹冠層中已有紅楠、大葉楠的踪跡，由此顯示紅楠及大葉楠在不久的未來將漸次取代尖葉槭而成為森林中的優勢分子。尖葉槭社會之組成可以表十二代表之。

表十二 尖葉槭植物社會

地點 磺嘴山前			海拔 790 M			面積 10 × 10 M ²		
大喬木層(7M)			灌木層(2M)			草本層(50 cm)		
覆 蓋 度	群 居 性	種 類	覆 蓋 度	群 居 性	種 類	覆 蓋 度	群 居 性	種 類
5 3	尖葉槭		2 1	狹瓣八仙花		1 2	狹瓣八仙花	
2 +	米碎柃木		2 +	假柃木		1 1	三葉爬崖藤	
2 +	紅楠		1 1	小花鼠刺		1 1	假柃木	
1 +	長葉木薑子		1 1	台灣樹參		1 1	山菊	
1 +	大葉楠		++	台灣黃鯉藤		+ 1	台灣樹參	
1 +	山龍眼		++	司氏懸鉤子		+ 1	紅楠	
1 +	黑松		++	變葉懸鉤子		++	斜方複葉耳蕨	
			++	耄葉樹		++	熱帶鱗蓋蕨	
			++	銳葉柃木		++	長葉木薑子	
			++	蓬萊藤		++	紅果金粟蘭	
			++	牛乳榕		++	蓬萊藤	
			++	燈籠花		++	五節芒	
			++	菝葜類		++	冷飯藤	
						++	山龍眼	
						++	芒箕	
						++	寒梅	

(2)昆欄樹社會

在七星山海拔一千公尺左右草原區內的各凹谷中，昆欄樹常形成純林狀態。樹幹上附生台灣藤漆（*Rhus ambigua*），林下則密生台灣矢竹。這是由台灣矢竹社會經過消長演替後而形成的森林社會，其代表樣區之組成如表十三所示。

表十三昆欄樹植物社會

地點 七星山西坡								
海拔 1000 M								
面積 10 × 10 M ²								
大喬木層(8M)			灌木層(2M)		草本層(50cm)			
覆 蓋 度	群 居 性	種 類	覆 蓋 度	群 居 性	種 類	覆 蓋 度	群 居 性	種 類
5 1	昆欄樹		5 5	台灣矢竹		2 4	台灣藤漆	
1 1	台灣藤漆		2 3	台灣藤漆		2 2	阿里山赤車使者	
1 +	灰木		1 1	狹瓣八仙花		2 2	冷飯藤	
			1 1	五節芒		1 +	全緣卷柏	
			++	長葉木薑子		++	細果金粟蘭	
			++	台灣樹參		++	七葉一枝花	
			++	桃葉珊瑚		++	小麥門冬	
			++	銳葉柃木		++	台灣樹參	
			++	小花鼠刺		++	書帶蕨	
			++	昆欄樹		++	白兩金	
			++	臭黃荆		++	胡麻花	
			++	滿山紅		++	假柃木	
			++	假柃木		++	昆欄樹	
			++	紅楠		++	粟蕨	

(3)紅楠社會

為本山區分佈最廣，最穩定的社會之一，除優勢種紅楠外，伴生的樹種有樹杞、楊桐、饅頭果 (Glochidion rubrum)、墨點櫻桃、台灣杞李復等。林下草本以生根卷柏、廣葉鋸齒雙蓋蕨及斜方複葉耳蕨等為主。表十四為代表樣區。

(4)長梗紫麻社會

所佔區域面積甚小，分佈於碎石礫所填滿的潮濕山谷，如往楓林瀑布途中的河谷，屬於早期的森林。由於林冠層已有大香葉樹，林下有大葉楠，紅楠小苗，因此不久將被取代而成為以大葉楠等為主的社會。表十五為代表樣區。

(5)大葉楠社會

為本山區主要優勢社會之一，以海拔較低處 (700 m以下) 或較潮濕的山坡及谷地為

表十四 紅楠植物社會

地點 大屯西坡				海拔 850 M				面積 10 × 10 M ²			
大喬木層(6M)		小喬木層(4M)		灌木層(2M)		草本層(1M)					
覆 蓋 度	群 居 性	種 類	覆 蓋 度	群 居 性	種 類	覆 蓋 度	群 居 性	種 類	覆 蓋 度	群 居 性	種 類
4	1	紅楠	2	1	銳葉柃木	2	1	台灣山香圓	2	3	圓果秋海棠
1	+	細葉饅頭果	1	1	紅楠	1	2	三葉爬崖藤	2	2	廣葉鋸齒雙蓋蕨
1	+	樹杞	1	+	牛乳榕	1	2	樹參	2	2	斜方複葉耳蕨
1	+	楊桐	++	拔葜類	江某	1	1	墨點櫻花	1	1	紅果金粟蘭
			++			1	1	白花瑞香	1	1	尖葉耳蕨
						1	1	樹杞	1	1	觀音座蓮
						++	細葉饅頭果		1	1	求米草
						++			1	1	山薑
						++	長葉木薑子		++	斯氏懸鈎子	
						++	波氏星蕨		++		
						++	五爪龍		++	野小毛蕨	
						++	伏石蕨		++	生根卷柏	
						++	藤花椒		++	日本女貞	
						++	虎皮楠		++	藤花椒	
						++	風藤		++	樹杞	
									++	腎蕨	
									++	杜英	

其主要分佈地，每每形成20公尺高的大樹。伴生樹種有紅楠、長葉木薑子、墨點櫻桃等；樹冠下生長的台灣山香圓、山龍眼、山橘，長梗紫麻也多是典型的濕生植物。最值得注意的是草本層常為冷清草所覆蓋。其代表樣區如表十六所示。

除了上述的天然林外，造林地在林區內亦佔有相當大的面積，日據時代所造植者，距今已五十多年，現以面天坪附近最為完整，樹高在15公尺，胸徑達兩人合抱，主要樹種為琉球松(*Pinus luchuensis*)和黑松(*Pinus thunbergii*)，林冠已不再鬱閉，二子山的黑松甚至大部已死亡，林下闊葉樹大都已成林(如表十七、十八所示)。民國四十二年起，陽明山管理局陸續造林，樹種以相思樹(*Acacia confusa*)、黑松、琉球松和柳杉(*Cryptomeria*)

表十五 長梗紫麻植物社會

地點 河床			
海拔 725 M			
面積 10 × 10 M ²			
大喬木層(7M)		灌木層(1.5M)	草本層(50cm)
覆 蓋 度	群 居 性	覆 蓋 度	群 居 性
5 3	長梗紫麻	1 1	牛乳榕
5 1	大香葉樹	++	赤車使者
		++	鴨腳木
		++	台灣馬蘭
		++	求米草
		++	斜方複葉耳蕨
		++	六葉野木瓜
			墨點櫻桃
			觀音座蓮
			東陵草
			大葉楠
			牛乳榕
			鴨跖草
			紅楠
			風藤

meria japonica)為主。最近，台北市政府亦在夢幻湖，頂山山列積極造林，樹種以柳杉、楓香為主。

表十六 大葉楠植物社會

地點 鹿角溪近谷				海拔 700 M				面積 10 × 10 M ²							
大喬木層(20M)				小喬木層(10M)				灌木層(3M)				草本層(1M)			
覆 蓋 度	群 居 性	種 類	覆 蓋 度	群 居 性	種 類	覆 蓋 度	群 居 性	種 類	覆 蓋 度	群 居 性	種 類	覆 蓋 度	群 居 性	種 類	覆 蓋 度
5 1	大葉楠	2 +	大葉楠	2 2	山龍眼	5 5	冷清草								
1 +	長葉木薑子	2 +	紅楠	2 2	山橘	1 2	風藤								
1 +	紅楠	1 1	山龍眼	1 1	文山雞屎樹	1 1	小葉複葉耳蕨								
		1 1	山菊	1 1	觀音座蓮	1 1	細葉複葉耳蕨								
		1 +	台灣山香圓	1 1	山豆根	1 1	拔葜								
		1 +	米碎柃木	1 1	柏拉木	++	廣葉鋸齒鱗蓋蕨								
		1 +	墨點櫻桃	++	毛玉葉金花	++	米碎柃木								
		1 +	樹杞	++	墨點櫻桃	++	全緣卷柏								
				++	銳葉柃木	++	東陵草								
				++	桃葉珊瑚	++	角桐草								
				++	長梗紫麻	++	鴨胸木								
				++	大香葉樹	++	山龍眼								
				++	樹杞	++	白兩金								
						++	菝葜								

表十七 琉球松造林地之植物社會

地點 中興農場下向天坪				海拔 775 M				面積 10 × 10 M ²			
大喬木層(30M)		小喬木層(10M)		灌木層(4M)		草本層(1M)					
覆蓋度	群居性	種類	覆蓋度	群居性	種類	覆蓋度	群居性	種類	覆蓋度	群居性	種類
5 5	琉球松	3 1	米碎柃木	2 2	米碎柃木	3 3	廣葉鋸齒雙蓋蕨				
1 1	崖石榴	3 1	紅楠	1 1	台灣矢竹	2 3	五瓜龍				
		1 2	毛玉葉金花	1 1	山龍眼	1 3	寒梅				
		1 +	細葉饅頭果	1 1	菝葜類	1 2	米碎柃木				
		1 +	牛乳榕	1 1	石筆	1 1	斜方複葉耳蕨				
		1 +	島槐	+ 1	毛玉葉金花	1 1	熱帶鱗蓋蕨				
		+ 1	柃樹藤	+ 1	墨點櫻桃	+ 1	台灣常春藤				
		+ +	虎皮楠	+ 1	青剛櫟	+ 1	肉穗野牡丹				
				+ 1	牛乳榕	+ 1	伏石蕨				
				+ 1	樹杞	+ 1	風藤				
				+ 1	紅楠	+ 1	山翦				
				+ +	菲律賓白匏子	+ +	司氏懸鈎子				
				+ +	台灣山桂花	+ +	瓦氏鳳尾蕨				
				+ +	五爪龍	+ +	觀音座蓮				
				+ +	水冬瓜	+ +	墨點櫻桃				
				+ +	江某	+ +	水冬瓜				
				+ +	楊桐	+ +	東陵草				
				+ +	樹參	+ +	蓬萊藤				
						+ +	菝葜類				
						+ +	五味子				
						+ +	雞屎藤				
						+ +	月桃				
						+ +	申跋				
						+ +	樹杞				

+

表十八 黑松造林地之植物社會

地點 二子山		海拔 830 M		面積 10 × 10M ²				
大喬木層(6M)		小喬木層(3.5M)		灌木層(1.5M)		草本層(0.7M)		
覆 蓋 度	群 居 性	種 類	覆 蓋 度	群 居 性	種 類	覆 蓋 度	群 居 性	種 類
5 2	紅楠	2 1 鄭氏胡頹子	2 2	台灣山桂花	3 3	廣葉鋸齒雙蓋蕨		
1 1	細葉饅頭果	1 1 台灣樹參	1 1	墨點櫻桃	2 2	斜方複葉耳蕨		
1 1	黑松	1 + 牛乳榕	1 1	牛乳榕	2 2	小葉複葉耳蕨		
		1 + 紅楠	1 1	燈稱花	2 2	三葉爬崖藤		
			1 1	樹杞	2 2	熱帶鱗蓋蕨		
			1 +	紅楠	2 2	薄葉柃木		
			++	杜英	2 2	五爪龍		
					2 2	山月桃		
					1 3	紅楠		
					1 1	變葉懸鈎子		
					1 1	毛玉葉金花		
					1 1	台灣杪櫟		
					1 1	冷飯藤		
					1 1	菝葜類		
					1 1	竹葉草		
					1 1	山荊		
					++	司氏懸鈎子		
					++	細葉饅頭果		
					++	台灣山桂花		
					++	深山雙蓋蕨		
					++	波氏星蕨		
					++	台灣樹參		
					++	島田澤蘭		
					++	白花瑞香		
					++	牛乳榕		
					++	珍珠蓮		
					++	藤花椒		
					++	杜虹花		
					++	伏石蕨		
					++	東陵草		
					++	蹄蓋蕨		
					++	燈稱花		
					++	風藤		
					++	樹杞		
					++	芒箕		
					++	楊梅		
					++	腎蕨		

伍、植被之維護及利用

一、特殊及稀有植物保護區(如圖五)

1.水韭保護區

台灣水韭是台灣之特產種，在世界上獨一無二，而台灣本身也只出產於夢幻湖，為極珍貴的種類，因此須嚴加保護。目前夢幻湖附近已有各種人為設施如道路、涼亭等，此等設施不宜再擴大。夢幻湖旁之空間極小，應禁止露營、伐木炊事等活動，以防垃圾污水流入池中。此等活動可移至教育電台南側市府所建之遊樂區內進行。由於夢幻湖之水量有限，遇枯水季，往往乾枯。如乾枯過久可能導至其死亡，因此如可能，另外尋找類似之水池加以繁衍，使其能長久存在。

2.紅星杜鵑保護區

杜鵑花種類頗多，可歸納為二大群，即杜鵑類及躑躅類。前者葉小型而呈紙質，植株一般低矮作灌木叢生狀；而後者葉大型呈革質，植株高大呈喬木狀。紅星杜鵑即屬於躑躅類。紅星杜鵑原盛產於菜公坑山、七星山及金瓜石等處，目前菜公坑山已無踪跡，金瓜石一帶因空氣污染，亦極為稀少。七星山也僅在西南坡海拔1000公尺左右有十餘株，而此等所餘植株均為不易採伐及移植之喬木。凡小株者早已被移下山做為盆栽之用。紅星杜鵑花形美觀，應加維護，否則有滅種之慮。因此將其生長地區劃為保護區，除嚴禁摘折移植外，最好能設法插枝繁殖，以增加其數量。

3.中原杜鵑保護區

中原杜鵑僅分佈於七星山四周海拔800—1100公尺處，是地理分佈極為狹窄的種類。外形低矮，呈匍匐性而平臥於岩壁上，十分特殊而稀少，須加以保護。

4.西施花保護區


西施花亦為杜鵑花科躑躅類的一分子，樹高有時達10公尺。平時貌不驚人，但開花時極為美麗，日人稱之為幻影中之花朵。其分佈較為零散，但以馬槽一帶之闊葉林中較多而集中，因此以此區為保護區。

5.鐘萼木保護區

鐘萼木之原產地在中國大陸。最近始在台灣發現，僅分佈於馬槽附近，共約30株左右，因此為陽明山國家公園之特產種。其分佈區與西施花同，故兩者保護區重疊。

二、特殊植被保護區(如圖五)

1.北磺溪上游



1. 特殊及稀有植物保護區
2. 北礦溪植被保護區
3. 向天池植被保護區
4. 野生杜鵑花遊憩區

圖五 植被之維護及利用分區圖

特殊植被保護區位於上磺溪上游（另稱清水溪或鹿角坑溪）諸支流區域，即以七星山鞍部至竹子山稜線之東南坡面為主，另包括陽金公路至溪流之部分坡地。整個區域除少數平坦稜線上有些過去種植茶葉及造林之痕跡外，幾乎稱得上是大屯山系最原始的闊葉林區。區內特別在諸支流溪澗間，林木繁茂，鬱鬱蔥蔥。巨大之紅楠、大葉楠、昆欄樹、楓香、九芎等處處可見，附生之蕨類，攀藤長滿樹幹，林下尚有樹蕨、金狗毛蕨、觀音座蓮等大型蕨類，充滿熱帶雨林之氣息。此等景觀與大屯山、七星山一帶迥然相異。即使台灣低海拔地區，亦難得一見。十足表現出數百年前台灣的本來面貌。況且正位於台北近郊，更應加以保護，以為大眾冥搜閑奧，曠覽幽遐之最佳處所。

本區所包含植物種類繁多，不乏少見之種類，如四照花、島槐，其他觀賞性之種類亦不少，如春天開花之金毛杜鵑、秋天葉紅似火之青楓、遍地可見之秋海棠等。

惟近年來後山等地之居民，常常進入本區，將高大參天之楓香砍倒，就地種植香菇，嚴重破壞生態景觀，必須嚴加禁止。另外本區因有楓林瀑布，每吸引一些遊客至此遊覽，垃圾隨地丟棄，不甚雅觀，應設法宣導及處理。本區雖為特別保護區，但為使國內外遊客得一覽景緻，可就現有登山小徑加以整修，使易於行，同時增建一些公廁等設施。

2. 向天池

如同前述，本區面積不大，原火山口業已為堆積物所填滿而形成一平坦之圓谷形地貌，其中心在雨後仍會積水。由於本區之湖沼植被自中心向四周顯現出水生、草原、灌叢及森林等不同階段的植物社會演進，在生態學及教育觀點上極具意義，值得設立為生態保護區。同時本區景色優美，適合有條件之旅遊。

三、野生杜鵑花遊憩區(如圖五)

珍海誌衡曾載「杜鵑滿滇山，曾行懷州鄉，穿花數十里，花高盈丈，紅雲夾與，疑人紫霄，行彌日方出」，可見雲南德宏一帶杜鵑花之盛。陽明山國家公園內之杜鵑花景象雖無此盛況，但如稍加人工繁殖，亦能到達繽紛簇錦滿山紅的境地。

目前公園區內產量最多的當屬金毛杜鵑，該種的主要分佈區位於公園西側，即面天、大屯、菜公坑、小觀音等諸山及其所包圍之地區，性喜向陽之草生地或台灣竹林地。此區內另有一種大屯山之特產即大屯杜鵑分佈，位於大屯坪一地。兩者之花均為紅色，極具觀賞價值，特別是金毛杜鵑，花多而密，佈滿整樹，艷麗非凡。因此杜鵑花遊憩區之範圍即為金毛杜鵑之主要分佈區。

遊憩區內復以大屯坪、中興農場及面天坪三處為中心區。此三區為平坦之草生地，互相貫連。可大量栽植金毛及大屯杜鵑，進行造園工作，使成大面積之美麗花園。另外在四週之林緣，栽植西施花，以增加景緻。如此對大屯杜鵑可兼收觀賞及保護之效。由於杜鵑花之花期介於春季，其他季節之景色便嫌單調，因此在路旁加植青楓、尖葉槭、楓香等觀賞樹種以

及春秋開花之自生種類亦為必需。

將來遊客可經由數出入口進出此區，例如自大屯鞍部登大屯山，再南下大屯坪，這是一條較費力之途徑；或從大屯鞍部直接沿大屯山西北到達中興農場；較不良於行者，可自于右任墓步行十數分鐘進入中興農場；另外自中青岩上面天坪亦為一途。全區均以步行，車輛停於大屯鞍部一帶，不得入內。

此野生杜鵑花遊憩區之設立，可使遊客在觀賞完後山公園之外來杜鵑花後，再進入另一種景觀非凡，感受特異的境地中，充分達成陶冶心情，融入自然的目的。



陸、參考文獻

1. 台灣植物同好會 大屯火山叢植物誌 大屯國立公園協會，昭和16年。
2. 郁永河 禪海紀遊 台灣文獻叢刊第四四種 台灣銀行經濟研究室編印 民國48年。
3. 李鹿草 陽明山區土地利用之自然地理因素 台灣大學地理學系研究報告第二期，62—97頁 民國53年。
4. 亢玉瑾 陽明山區氣候之分析研究 台灣大學地理學系研究報告第四期，61—101頁 民國56年。
5. Chuang Tsan-iang, 1960. Preliminary notes on the vegetation and flora of mt. Ta-tun, Taipei. I. vegetation. Bot. Bull. Acad. Sinica 1 : 77—86, 169—175.
6. Liew Fah-seong, 1977. A list of the pteridophytes found in the yang-mingshan area in northern Taiwan, with a note on their phytogeography. Quarterly Journal of the Taiwan museum 30 : 231—251.
7. Editorial committee on Flora of Taiwan, 1975—1979. Flora of Taiwan Vol. 1—6. Epoch Publishing Co., Ltd. Taipei, Taiwan.

附錄一 陽明山國家公園自生植物名錄

學 名	中 名	用 途
A. Pteridophyta	蕨類植物	
1. Psilotaceae	松葉蕨科	
1. <i>Psilotum nudum</i> (L.) Beauv.	松葉蕨	觀賞
2. Lycopodiaceae	石松科	
2. <i>Lycopodium casuarinoides</i> Spring	木賊葉石松	觀賞
3. <i>Lycopodium cernuum</i> L.	過山龍	"
4. <i>Lycopodium clavatum</i> L.	石松	"
5. <i>Lycopodium hamiltonii</i> Spring	福氏石松	"
6. <i>Lycopodium serratum</i> Thunb. var. <i>longipetiolatum</i> Spring	長柄千層塔	觀賞
6. <i>Lycopodium serratum</i> Thunb. var. <i>myriophyllifolium</i> Hay.	阿里山千層塔	觀賞
3. Selaginellaceae	卷柏科	
7. <i>Selaginella delicatula</i> (Desv.) Alston	金線卷柏	觀賞
8. <i>Selaginella doederleinii</i> Hieron.	生根卷柏	"
9. <i>Selaginella involvens</i> (Sw.) Spring	密葉卷柏	"
10. <i>Selaginella leptophylla</i> Bak.	膜葉卷柏	"
11. <i>Selaginella mollendorffii</i> Hieron.	異葉卷柏	"
12. <i>Selaginella remotifolia</i> Spring	疏葉卷柏	"
13. <i>Selaginella tamariscina</i> (Beauv.) Spring	萬年松	"
4. Isoetaceae	水韭科	
14. <i>Isoetes taiwanensis</i> DeVol	台灣水韭	觀賞
5. Equisetaceae	木賊科	
15. <i>Equisetum ramosissimum</i> Desf. Subsp. <i>debile</i> (Roxb.) Hauke.	台灣木賊	觀賞
6. Salviniaceae	槐葉蘋科	
16. <i>Salvinia natans</i> (L.) All.	槐葉蘋	
7. Azollaceae	滿江紅科	
17. <i>Azolla pinnata</i> R. Brown.	滿江紅	
8. Marsileaceae	蘋科	
18. <i>Marsilea minuta</i> L.	南國田字草	

學 名	中 名	用 途
9. Ophioglossaceae	瓶爾小草科	
19. <i>Botrychium daucifolium</i> (Wall.) Hook. & Grev.	薄葉大陰地蕨	
20. <i>Ophioglossum petiolatum</i> Hook.	鈍頭瓶爾小草	
10. Marattiaceae	觀音座蓮科	
21. <i>Angiopteris lygodiifolia</i> Rosenst.	觀音座蓮	
11. Osmundaceae	紫科	
22. <i>Osmunda banksiae-folia</i> (Pr.) Kuhn	粗齒革葉紫萁	
23. <i>Osmunda japonica</i> Thunb.	紫萁	
12. Schizaeaceae	海金沙科	
24. <i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.	海金沙	
25. <i>Lygodium microphyllum</i> (Cav.) R. Brown	小葉海金沙	
13. Gleicheniaceae	裏白科	
26. <i>Dicranopteris linearis</i> (Burm. f.) Under	芒萁	
27. <i>Diplopterygium chinensis</i> (Rosenst.) DeVol	中華裏白	
28. <i>Diplopterygium glaucum</i> (Houtt.) Nakai	裏白	
14. Hymenophyllaceae	膜蕨科	
29. <i>Hymenophyllum barbatum</i> (v. d. Bosch) Bak.	華東膜蕨	
30. <i>Mecodium badium</i> (Hook. & Grev.) Copel.	落蕨	
31. <i>Mecodium polyanthos</i> (Sw.) Copel.	細葉落蕨	
32. <i>Mecodium wrightii</i> (v. d. Bosch) Copel.	萊氏落蕨	
33. <i>Vandenboschia auriculata</i> (Bl.) Copel.	瓶蕨	
34. <i>Vandenboschia orientalis</i> (C. Chr.) Ching	華東瓶蕨	
15. Parkeriaceae	水蕨科	
35. <i>Ceratopteris thalictroides</i> (L.) Brongn.	水蕨	
16. Dicksoniaceae	蚌殼蕨科	
36. <i>Cibotium cumingii</i> Kunze	菲律賓金狗毛蕨	
17. Cyatheaceae	桫欓科	
37. <i>Alsophila denticulata</i> Baker	韓氏桫欓	
38. <i>Alsophila metteniana</i> Baker	台灣樹蕨	
39. <i>Alsophila podophylla</i> Hooker	鬼桫欓	
40. <i>Alsophila spinulosa</i> (Hook.) Tryon	台灣桫欓 (刺桫欓)	觀賞，養蘭
41. <i>Sphaeropteris lepifera</i> (Hook.) Tryon	筆筒樹	觀賞，筆筒
18. Plagiogyriaceae	瘤足蕨科	

學名	中名	用途
42. <i>Plagiogyria adnata</i> (Blume) Bedd.	瘤足蕨	
43. <i>Plagiogyria euphlebia</i> (Kunze) Mett. var. <i>grandis</i> (Copel.) DeVol	尾葉瘤足蕨	
44. <i>Plagiogyria stenoptera</i> (Hance) Diels	耳形瘤足蕨	
19. Blechnaceae	鳥毛蕨科	
45. <i>Blechnum hancockii</i> Hance	韓氏鳥毛蕨	
46. <i>Blechnum orientale</i> L.	鳥毛蕨	
47. <i>Woodwardia japonica</i> (L.f.) Sm.	日本狗脊蕨	
48. <i>Woodwardia kempii</i> Copel.	細葉狗脊蕨	
49. <i>Woodwardia orientalis</i> Swartz.	東方狗脊蕨	
20. Dipteridaceae	雙扇蕨科	
50. <i>Dipteris conjugata</i> Reinw.	雙扇蕨	
21. Cheiroleuriaceae	燕尾蕨科	
51. <i>Cheiroleuria bicuspis</i> (Blume) Presl	燕尾蕨	
22. Polypodiaceae	水龍骨科	
52. <i>Colysis elliptica</i> (Thunb.) Ching	橢圓線蕨	
53. <i>Colysis wrightii</i> Ching.	萊氏線蕨	
54. <i>Crypsinus hastatus</i> (Thunb.) Copel.	三葉茀蕨	
55. <i>Drynaria fortunei</i> (Kunze) J. Sm.	槲蕨	
56. <i>Lemmophyllum microphyllum</i> Presl	伏石蕨	
57. <i>Lepisorus thunbergianus</i> (Kaulf.) Ching	瓦葦	
58. <i>Microsorium buergerianum</i> (Miq.) Ching	波氏星蕨	
59. <i>Microsorium fortunei</i> (Moore) Ching	大星蕨	
60. <i>Microsorium pteropus</i> (Bl.) Copel.	三叉葉星蕨	
61. <i>Polypodium formosanum</i> Bak.	台灣水龍骨	
62. <i>Pseudodrynaria coronans</i> (Mett.) Ching	崖薑蕨	
63. <i>Pyrrosia adnascens</i> (Sw.) Ching	抱樹石葦	
64. <i>Pyrrosia linearifolia</i> (Hook.) Ching	絨毛石葦	
65. <i>Pyrrosia lingua</i> (Thunb.) Farw.	石葦	
23. Vittariaceae	書帶蕨科	
66. <i>Antrophyum formosanum</i> Hieron.	台灣車前蕨	
67. <i>Vittaria angust o-elongata</i> Hay.	姬書帶蕨	
68. <i>Vittaria flexuosa</i> Fee	書帶蕨	
24. Dennstaedtiaceae	碗蕨科	
69. <i>Dennstaedtia hirsuta</i> (Sw.) Mett. ex Miq.	細毛碗蕨	

學 名	中 名	用 途
70. <i>Dennstaedtia scabra</i> (Wall.) Moore	碗蕨	
71. <i>Dennstaedtia scandens</i> (Blume) Moore	刺柄碗蕨	
72. <i>Histiopteris incisa</i> (Thunb.) J. Sm.	栗蕨	
73. <i>Hypolepis punctata</i> (Thunb.) Mett.	姬蕨	
74. <i>Hypolepis tenuifolia</i> (Forst.) Bernh.	細葉姬蕨、臺灣姬蕨	
75. <i>Microlepia hookeriana</i> (Wall.) Presl	虎克氏鱗蓋蕨	
76. <i>Microlepia marginata</i> (Panzer) C. Chr.	邊緣鱗蓋蕨	
77. <i>Microlepia obtusiloba</i> Hay.	圓羽鱗蓋蕨	
78. <i>Microlepia strigosa</i> (L.) Moore	熱帶鱗蓋蕨	
79. <i>Microlepia speluncae</i> (Thunb.) Presl	粗毛鱗蓋蕨	
80. <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn subsp. <i>latiusculum</i> (Desv.) Shieh	蕨	
25. Lindsaeaceae	陵齒蕨科	
81. <i>Lindsaea japonica</i> (Bak.) Diels	日本陵齒蕨	
82. <i>Lindsaea odorata</i> Roxb.	陵齒蕨	
83. <i>Lindsaea orbiculata</i> (Lam.) Mett.	圓葉陵齒蕨	
84. <i>Lindsaea orbiculata</i> (Lam.) Mett. var. <i>commixta</i> (Tagawa) Kramer	海島陵齒蕨	
84. <i>Lindsaea orbiculata</i> (Lam.) Mett. var. <i>recedens</i> (Ching) Shieh	三角葉陵齒蕨	
85. <i>Sphenomeris biflora</i> (Kaulf.) Tagawa	潤片烏蕨	
86. <i>Sphenomeris chusana</i> (L.) Copel.	烏蕨	
26. Davalliaceae	骨碎補科	
87. <i>Davallia griffithiana</i> Hook.	杯狀蓋骨碎補	
88. <i>Davallia mariesii</i> Moore ex Bak.	海州骨碎補	
89. <i>Humata vestita</i> (Blume) Moore	熱帶陰石蕨	
90. <i>Humata trifoliata</i> Cav.	鮮葉陰石蕨	
27. Pteridaceae	鳳尾蕨科	
91. <i>Onychium japonicum</i> (Thunb.) Kunze	日本金粉蕨	
92. <i>Pteris cadieri</i> Christ	二形鳳尾蕨	
93. <i>Pteris dispar</i> Kunze	天草鳳尾蕨	
94. <i>Pteris ensiformis</i> Burm.	箭葉鳳尾蕨	
95. <i>Pteris fauriei</i> Hieron.	傅氏鳳尾蕨	
96. <i>Pteris multifida</i> Poir.	鳳尾蕨	
97. <i>Pteris ryukyuensis</i> Tagawa	琉球鳳尾蕨	
98. <i>Pteris semipinnata</i> L.	半邊羽裂鳳尾蕨	

學名	中名	用途
99. <i>Pteris tohioi</i> Masam.	鈴木氏鳳尾蕨	
100. <i>Pteris vittata</i> L.	鱗蓋鳳尾蕨	
101. <i>Pteris wallichiana</i> Ag.	瓦氏鳳尾蕨	
28. Adiantaceae	鐵線蕨科	
102. <i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	鐵線蕨	
103. <i>Adiantum caudatum</i> L.	鞭葉鐵線蕨	
104. <i>Adiantum diaphanum</i> Bl.	長尾鐵線蕨	
105. <i>Adiantum hispidulum</i> Sw.	毛葉鐵線蕨	
106. <i>Adiantum philippense</i> L.	半月形鐵線蕨	
29. Oleandraceae	蓀蕨科	
107. <i>Arthropteris palisotii</i> (Desv.) Alston	蓀蕨	
108. <i>Nephrolepis auriculata</i> (L.) Trimen	腎蕨	
109. <i>Nephrolepis biserrata</i> (Sw.) Schott	長葉腎蕨	
110. <i>Nephrolepis hirsutula</i> (Forst.) Presl	毛葉腎蕨	
30. Asplidiaceae	三叉蕨科	
111. <i>Ctenitis eatoni</i> (Bak.) Ching	愛德氏肋毛蕨	
112. <i>Ctenitis subglandulosa</i> (Hance) Ching	肋毛蕨	
113. <i>Hemigramma decurrens</i> (Hook.) Copel.	沙皮蕨	
114. <i>Pleocnemia rufinervis</i> (Hay.) Nakai	網脈突齒蕨	
115. <i>Tectaria decurrens</i> (Pr.) Copel.	翅柄三叉蕨	
116. <i>Tectaria phaeocaulis</i> (Rosenst.) C. Chr.	蛇脈三叉蕨	
117. <i>Tectaria subtriphylla</i> (Hook. & Arn.) Copel.	三叉蕨	
31. Lomariopsidaceae	羅蔓藤蕨科	
118. <i>Bolbitis subcordata</i> (Copel.) Ching	海南實蕨	
119. <i>Egenolfia appendiculata</i> (Willd.) J. Sm.	刺蕨	
120. <i>Elaphoglossum coniforme</i> (Sw.) Schott	阿里山舌蕨	
32. Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	
121. <i>Arachniodes aristata</i> (Forst.) Tindle	細葉複葉耳蕨	
122. <i>Arachniodes festina</i> (Hance) Ching.	台灣兩面複葉耳蕨	
123. <i>Arachniodes pseudo-aristata</i> (Tagawa) Ohwi	小葉複葉耳蕨	
124. <i>Arachniodes rhomboidea</i> (Wall.) Ching	斜方複葉耳蕨	
125. <i>Cyrtomium falcatum</i> (L. f.) Presl	全緣貫眾蕨	
126. <i>Dryopteris formosana</i> (Christ) C. Chr.	台灣紅芭鱗毛蕨	
127. <i>Dryopteris labordei</i> (Christ) C. Chr.	疏葉鱗毛蕨	

學名	中名	用途
128. <i>Dryopteris polita</i> Rosenst.	台東鱗毛蕨	
129. <i>Dryopteris sordidipes</i> Tagawa.	落鱗鱗毛蕨	
130. <i>Dryopteris sparsa</i> (Don) O. Ktze	長葉鱗毛蕨	
131. <i>Polystichum hancockii</i> (Hance) Diels	韓氏耳蕨	
132. <i>Polystichum parvipinnulum</i> Tagawa	尖葉耳蕨	
33. <i>Thelypteridaceae</i>	金星蕨科	
133. <i>Christella acuminata</i> (Houtt.) Le'v.	小毛蕨	
134. <i>Christella dentata</i> (Forsk.) Brownsey & Jermy	野小毛蕨	
135. <i>Christella ensifera</i> (Tagawa) Holtt.	微縮小毛蕨	
136. <i>Christella papilio</i> (Hope) Holtt.	縮羽小毛蕨	
137. <i>Christella parasitica</i> (L.) Le'v.	密毛小毛蕨	
138. <i>Christella subarida</i> (Tatew. & Tagawa) Holtt.	小密腺小毛蕨	
139. <i>Dictyocline griffithii</i> Moore	聖蕨	
140. <i>Dictyocline griffithii</i> Moore var. <i>Wilsfordii</i> (Hook.) Moore	威氏聖蕨	
141. <i>Macrothelypteris forresiana</i> (Gaud.) Ching	大金星蕨	
142. <i>Metathelypteris adsendens</i> (Ching)	微毛凸軸蕨	
143. <i>Metathelypteris gracilescens</i> (Bl.) Ching	光葉凸軸蕨	
144. <i>Metathelypteris uraiensis</i> (Rosenst.) Ching	毛柄凸軸蕨	
145. <i>Parathelypteris beddomei</i> (Bak.) Ching	縮羽金星蕨	
146. <i>Parathelypteris glanduligera</i> (Kunze) Ching	密腺金星蕨	
147. <i>Parathelypteris japonica</i> (Bak.) Ching	栗柄金星蕨	
148. <i>Phegopteris decursive-pinnata</i> (van Hall) Fe'e.	短柄卵果蕨	
149. <i>Pneumatopteris truncata</i> (Poir.) Holtt.	稀毛蕨	
150. <i>Pronephrium triphyllum</i> (Sw.) Holtt.	三葉新月蕨	
151. <i>Pronephrium triphyllum</i> var. <i>parishii</i> (Bed.) Kuo	羽葉新月蕨	
152. <i>Pseudocyclosorus esquirolii</i> (Christ)		

學名	中名	用途
Ching 153. <i>Pseudophegopteris subaurita</i> (Tagawa) Ching 154. <i>Sphaerostephanos taiwanensis</i> (C. Chr.) Holtt.	假毛蕨 光囊紫柄蕨 台灣圓腺蕨 蹄蓋蕨科 過溝菜蕨 假蹄蓋蕨 逆葉蹄蓋蕨 蓬菜蹄蓋蕨	
34. <i>Athyriaceae</i> 155. <i>Anisogonium esculentum</i> (Retz.) Presl 156. <i>Athyriopsis japonica</i> (Thunb.) Ching 157. <i>Athyrium reflexipinnum</i> Hay. 158. <i>Athyrium tozanense</i> Hay. 159. <i>Dictyodroma formosana</i> (Rosenst.) Ching	假腸蕨 廣葉鋸齒雙蓋蕨 德氏雙蓋蕨 細柄雙蓋蕨 裂葉雙蓋蕨 深山雙蓋蕨 廣葉深山雙蓋蕨 單葉雙蓋蕨	
160. <i>Diplazium dilatatum</i> Blume 161. <i>Diplazium doederleinii</i> (Luerss.) Makino 162. <i>Diplazium donianum</i> (Mett.) Tard.-Blot 163. <i>Diplazium lobatum</i> (Tagawa) Tagawa 164. <i>Diplazium metteniauum</i> (Miq.) C. Chr. 165. <i>Diplazium petri</i> Tard.-Blot 166. <i>Diplazium subsinuatum</i> (Wall. ex Hook. & Grev.) Tagawa	刺鱗雙蓋蕨 鋸齒雙蓋蕨 毛柄蹄蓋蕨 鐵角蕨科 山蘇花 薄葉鐵角蕨 南海鐵角蕨 叢葉鐵角蕨 縮羽鐵角蕨 台灣山蘇花 生芽鐵角蕨 綠柄剪葉鐵角蕨 尖葉鐵角蕨 單邊鐵角蕨 威氏鐵角蕨 菜氏鐵角蕨	
35. <i>Aspleniaceae</i> 170. <i>Asplenium antiquum</i> Makino 171. <i>Asplenium cheilosorum</i> Kunze ex Mett. 172. <i>Asplenium formosae</i> Christ 173. <i>Asplenium griffithianum</i> Hook. 174. <i>Asplenium incisum</i> Thunb. 175. <i>Asplenium nidus</i> L. 176. <i>Asplenium normale</i> Don 177. <i>Asplenium obscurum</i> Blume 178. <i>Asplenium ritoense</i> Hay. 179. <i>Asplenium unilaterale</i> Lam. 180. <i>Asplenium wilfordii</i> Mett. ex Kuhn 181. <i>Asplenium wrightii</i> Eaton		

學 名	中 名	用 途
B. Gymnospermae	裸子植物	
36. Podocarpaceae	羅漢松科	
182. <i>Decussocarpus nagi</i> (Thunb.) de Laub.	竹柏	觀賞，建材
183. <i>Decussocarpus wallichianus</i> (Presl) de Laub.	大葉竹柏	觀賞，建材
C. Angiospermae	被子植物	
37. Myricaceae	楊梅科	
184. <i>Myrica rubra</i> Sieb. & Zucc. var. <i>acuminata</i> Nakai	銳葉楊梅	果樹
38. Juglandaceae	胡桃科	
185. <i>Engelhardtia roxburghiana</i> Wall.	黃杞	樹皮與葉可毒魚
39. Salicaceae	楊柳科	
186. <i>Salix warburgii</i> O. Seem.	水柳	觀賞
40. Betulaceae	樺木科	
187. <i>Alnus henryi</i> Schneider	台北樺木	薪炭，觀賞
41. Fagaceae	殼斗科	
188. <i>Castanopsis carlesii</i> (Hemsl.) Hay.	長尾柯	用材
189. <i>Castanopsis carlesii</i> var. <i>sessilis</i> Nakai	白枝櫟	用材
190. <i>Cyclobalanopsis acuta</i> (Thunb.) Liao var. <i>paucidentata</i> (Fr.) Liao	糙子櫟	用材
191. <i>Cyclobalanopsis gilva</i> (Blume) Oerst.	赤皮	果可食
192. <i>Cyclobalanopsis glauca</i> (Thunb.) Oerst.	鐵櫟	用材，觀賞
193. <i>Cyclobalanopsis longinux</i> (Hay.) Schott	錐果櫟	用材
194. <i>Limlia uraiana</i> (Hay.) Masam. & Tomiya.	櫟(淋漓，烏來柯)	用材
195. <i>Pasania ternaticupula</i> (Hay.) Schott.	三斗柯	用材
196. <i>Quercus variabilis</i> Blume	栓皮櫟	用材
42. Ulmaceae	榆科	
197. <i>Celtis formosana</i> Hay.	石朴	用材
198. <i>Celtis sinensis</i> Persson	朴樹	用材，觀賞
199. <i>Trema orientalis</i> (L.) Blume	山黃麻	火柴桿，造紙
200. <i>Trema virgata</i> (Roxb.) Blume	銳葉山黃麻	柴材
201. <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	櫟(雞油)	高級用材
43. Moraceae	桑科	
202. <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L'Herit. ex Vent.	構樹	葉為飼料，纖維

學名	中名	用途
203. <i>Ficus ampelas</i> Burm. f.	菲律賓榕	用材
204. <i>Ficus caulocarpa</i> (Miq.) Miq.	大葉雀榕	觀賞
205. <i>Ficus erecta</i> Thunb. var. <i>beecheiana</i> (Hook. & Arn.) King	牛乳榕	"
206. <i>Ficus fistulosa</i> Reinw. ex Blume	豬母乳	"
207. <i>Ficus formosana</i> Maxim.	天仙果	"
208. <i>Ficus formosana</i> Maxim. forma <i>shimadai</i> Hay.	細葉天仙果	"
209. <i>Ficus irisana</i> Elmer	糙葉榕	
210. <i>Ficus microcarpa</i> L. f.	榕樹	
211. <i>Ficus nervosa</i> Heyne.	九丁榕	
212. <i>Ficus pumila</i> L. var. <i>awkeotsang</i> (Mak.) Corn.	愛玉子	食用
213. <i>Ficus sarmentosa</i> Buch.-Ham. ex J. E. Sm. var. <i>nipponica</i> (Fr. & Sav.) Corn.	珍珠蓮(崖石榴)	觀賞
214. <i>Ficus septica</i> Burm. f.	稜果榕(常綠榕)	"
215. <i>Ficus virgata</i> Reinw. ex Blume	白肉榕(島榕)	"
216. <i>Ficus wightiana</i> Wall. ex Benth.	雀榕(赤榕)	"
217. <i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr.	葎草	藥用
218. <i>Malaisia scandens</i> (Lour.) Planch.	盤龍木(牛筋藤)	觀賞
219. <i>Morus australis</i> Poir.	小葉桑	果樹, 葉飼蠶
220. <i>Cudrania cochinchinensis</i> (Lour.) Kudo & Masam. var. <i>gerontogea</i> (Sieb. et Zucc.) Kudo & Masam.	台灣拓樹(蔓芝)	觀賞, 果藥用
44. Urticaceae	蕁麻科	
221. <i>Boehmeria densiflora</i> Hook. & Arn.	密花苧麻	觀賞, 纖維
222. <i>Boehmeria formosana</i> Hay.	台灣苧麻	纖維
223. <i>Boehmeria frutescens</i> Thunb.	青苧麻	觀賞
224. <i>Boehmeria zollingeriana</i> Wedd.	長葉苧麻	觀賞
225. <i>Dedregeasia edulis</i> (Sied. & Zucc.) Wedd.	水麻	果可食
226. <i>Elatostema edule</i> Rob.	闊葉樓梯草	
227. <i>Elatostema herbaceifolium</i> Hay.	台灣樓梯草	
228. <i>Elatostema lineolatum</i> Forst. var. <i>major</i> Thwait.	冷清草	
229. <i>Elatostema sessile</i> Forst. var. <i>cuspid-</i>		

學名	中名	用途
<i>atum</i> Wedd.	樓梯草	
230. <i>Gonostegia neurocarpa</i> (Yamam.) Yamam et Masam.	脈果石薯	
231. <i>Gonostegia hirta</i> (Blume) Miq.	糯米團	
232. <i>Gonostegia pentandra</i> (Roxb.) Miq. var. <i>hypericifolia</i> (Bl.) Masam.	石薯	
233. <i>Lecanthus sasakii</i> Hay.	長梗盤花麻	
234. <i>Nanocnide japonica</i> Blume	花點草	
235. <i>Pellionia arisanensis</i> Hay.	阿里山赤車使者	
236. <i>Pellionia radicans</i> (Sied. & Zucc.) Wedd.	赤車使者	
237. <i>Pellionia scabra</i> Benth.	糙葉赤車使者	
238. <i>Pellionia trilobulata</i> Hay.	裂葉赤車使者	
239. <i>Pilea brevicornuta</i> Hay.	短角冷水麻	
240. <i>Pilea funkikensis</i> Hay.	奮起湖冷水麻	
241. <i>Pilea microphylla</i> (L.) Leibn.	小葉冷水麻	
242. <i>Pilea peploides</i> (Gaud.) Hook. & Arn.	矮冷水麻	
243. <i>Pilea petiolaris</i> (Sieb. & Zucc.) Blume	長柄冷水麻	
244. <i>Pilea stipulosa</i> Miq.	圓瓣冷水麻	
245. <i>Pouzolzia elegans</i> Wedd. var. <i>formosana</i> Li	小雞油	
246. <i>Pouzolzia zeylanica</i> (L.) Benn.	霧水葛	
247. <i>Villebrunnea pedunculata</i> Shirai	長梗紫麻	
45. Proteaceae	山龍眼科	
248. <i>Helicia cochinchinensis</i> Lour.	紅葉樹	觀賞
249. <i>Helicia formosana</i> Hemsl.	山龍眼	材製箱盒
46. Loranthaceae	桑寄生科	
250. <i>Aspidixia articulata</i> (Burm. f.) Van Tieghem	椆櫟柿寄生	
251. <i>Hyphear delavayi</i> (Van Tieghem) Danser	大葉欓寄生	
47. Polygonaceae	蓼科	
252. <i>Polygonum barbatum</i> L.	毛蓼	
253. <i>Polygonum chinense</i> L.	火炭母草	藥用
254. <i>Polygonum cuspidatum</i> Sied. et Zucc.	虎杖	"
255. <i>Polygonum dichotomum</i> Blume	箭葉蓼	"
256. <i>Polygonum hydropiper</i> L.	蓼(水蓼)	"
257. <i>Polygonum japonicum</i> Meisn.	蠶蘭草	"

學名	中名	用途
258. <i>Polygonum longisetum</i> De Bruyn	睫穗蓼	藥用
259. <i>Polygonum multiflorum</i> Thunb. var. <i>hypoleucum</i> (Ohwi) Liu, Ying & Lai.	台灣何首烏 紅蓼	藥用
260. <i>Polygonum orientale</i> L.	紅蓼 (紅草)	
261. <i>Polygonum perfoliatum</i> L.	杠板歸	
262. <i>Polygonum persicaria</i> L.	春蓼	
263. <i>Polygonum posumbu</i> Buch.-Ham. ex Don	花蓼	
264. <i>Polygonum pubescens</i> Blume	腺花蓼 (八字蓼)	
265. <i>Polygonum senticosum</i> (Meisn.) Fr. & Sav	刺蓼	
266. <i>Polygonum thunbergii</i> Sieb. & Zucc. forma. <i>biconvexum</i> (Hay.) Liu, Ying & Lai	戟葉蓼	
267. <i>Polygonum trigonocarpum</i> (Mak.) Kudo & Masam.	細葉蓼	
268. <i>Polygonum viscosum</i> Buch.-Ham. ex Don	香蓼	
269. <i>Rumex acetosa</i> L.	酸模	
270. <i>Rumex crispus</i> L.	皺葉酸模	
271. <i>Rumex japonicus</i> Houtt.	羊蹄	
272. <i>Rumex maritimus</i> L.	連明子 (穀菜)	
48. Phytolaccaceae	商陸科	
273. <i>Phytolacca acinosa</i> Roxb.	台灣商陸	
49. Molluginaceae	粟米草科	
274. <i>Mollugo pentaphylla</i> L.	粟米草	
50. Portulacaceae	馬齒莧科	
275. <i>Portulaca insularis</i> Hosok.	小琉球馬齒莧	觀賞
276. <i>Portulaca oleracea</i> L.	馬齒莧	藥用
277. <i>Portulaca pilosa</i> L.	毛馬齒莧	
278. <i>Talinum triangulare</i> Willd.	土人蔘	藥用，觀賞
51. Caryophyllaceae	石竹科	
279. <i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	無心菜	
280. <i>Cerastium ianthes</i> Will.	卷耳	
281. <i>Drymaria cordata</i> (L.) Willd. subsp. <i>diandra</i> (Blume) I. Duke ex Hatus.	荷蓮豆草 (菁芳草)	
282. <i>Stellaria alsine</i> Grimm. var. <i>undulata</i> (Thunb.) Ohwi	天蓬草 (雀舌草)	
283. <i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop.	鵝兒腸	

學名	中名	用途
284. <i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	繁縷	
52. <i>Chenopodiaceae</i>	藜科	
285. <i>Chenopodium ambrosioides</i> L.	臭杏	蚊香
286. <i>Chenopodium serotinum</i> L.	小葉藜	
53. <i>Amaranthaceae</i>	莧科	
287. <i>Achyranthes aspera</i> L. var. <i>indica</i> L.	土牛膝 (印度牛膝)	藥用
287. <i>Achyranthes aspera</i> L. var. <i>rubro-fusca</i> Hook. f.	台灣牛膝 (紫莖牛膝)	
288. <i>Achyranthes longifolia</i> (Mak.) Mak.	柳葉牛膝	
289. <i>Achyranthes ogatai</i> Yamamoto	南天牛膝	
290. <i>Alternanthera nodiflora</i> R. Br.	節節花	
291. <i>Alternanthera sessilis</i> (L.) R. Br. ex Roem. & Schultes	蓮子草	
292. <i>Amaranthus spinosus</i> L.	刺莧	
293. <i>Amaranthus viridis</i> L.	野莧菜	
294. <i>Celosia argentea</i> L.	青葙	藥用
295. <i>Celosia cristata</i> L.	雞冠花	
54. <i>Magnoliaceae</i>	木蘭科	
296. <i>Michelia compressa</i> (Maxim.) Sargent	烏心石	貴重用材
55. <i>Annonaceae</i>	番荔枝科	
297. <i>Fissistigma oldhamii</i> (Hemsl.) Merr.	瓜馥木	
56. <i>Schisandraceae</i>	五味子科	
298. <i>Kadsura japonica</i> (L.) Dunal	南五味子	
57. <i>Lauraceae</i>	樟科	
299. <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Nees & Eberm.	樟樹	箱櫃，取精油 觀賞
300. <i>Cinnamomum insularimontanum</i> Hay.	山肉桂 (台灣肉桂)	用材，香料
301. <i>Cryptocarya concinna</i> Hance	土楠 (海南厚殼桂)	用材
302. <i>Lindera akoensis</i> Hay.	內冬子	柴薪
303. <i>Lindera communis</i> Hemsl.	香葉樹	柴薪
304. <i>Lindera glanca</i> (Sieb. & Zucc.) Blume	白葉鈞樟 (黑胡椒)	柴薪
305. <i>Lindera megaphyll</i> Hemsl.	大葉鈞樟 (大香葉樹)	用材
306. <i>Litsea acuminata</i> (Blume) Kurata	長葉木薑子	用材
307. <i>Litsea akoensis</i> Hay.	屏東木薑子	用材及柴薪
308. <i>Litsea cubeba</i> (Lour.) Person.	山胡椒	藥用
309. <i>Litsea krukovii</i> Kosterm.	小梗木薑子	柴薪

學名	中名	用途
310. <i>Litsea coreana</i> Lev.	鹿皮斑木薑子	觀賞
311. <i>Neolitsea konishii</i> (Hay.) Kane. & Sasaki	五掌楠	用材
312. <i>Neolitsea variabilima</i> (Hay.) Kane. & Sasaki	變葉新木薑子	用材
313. <i>Persea japonica</i> Sieb. ex Sieb. & Zucc.	大葉楠	用材
314. <i>Persea thunbergii</i> (Sieb. & Zucc.) Koster	豬腳楠(紅楠)	用材, 線香
315. <i>Persea zuihoensis</i> (Hayata) Li	香楠(瑞芳楠)	"
58. Trochodendraceae	昆欄樹科	
316. <i>Trochodendron aratoides</i> Sieb. & Zucc.	昆欄樹	造紙
59. Ranunculaceae	毛茛科	
317. <i>Clematis alsomitrifolia</i> Hay.	三葉鐵線蓮	
318. <i>Clematis gouriana</i> Roxb.	串鼻龍	
319. <i>Clematis leschenaultiana</i> DC.	锈毛鐵線蓮	
320. <i>Clematis tashiroi</i> Maxim.	琉球鐵線蓮	
321. <i>Clematis terniflora</i> DC. var. <i>robusta</i> (Carr.) Tamura.	鵝鑾鼻鐵線蓮	
322. <i>Ranunculus sieboldii</i> Miq.	水辣菜(辣子草)	
323. <i>Ranunculus ternatus</i> Thunb.	小毛茛	
324. <i>Thalictrum fauriei</i> Hay.	台灣唐松草(台灣鐵大烏)	
60. Berberidaceae	小藥科	
325. <i>Dysosma pleiantha</i> (Hance) Woodson	八角蓮	觀賞, 蛇藥
326. <i>Mahonia japonica</i> (Thunb.) DC.	十大功勞	觀賞
61. Lardizabalaceae	木通科	
327. <i>Akebia longeracemosa</i> Matsum.	台灣木通	藥用
328. <i>Stauntonia hexaphylla</i> (Thunb.) Dence.	石月	
62. Menispermaceae	防己科	
329. <i>Cocculus sarmentosus</i> (Lour.) Diels	鐵牛入石	藥用
330. <i>Cocculus trilobus</i> (Thunb.) DC.	木防己	"
331. <i>Pericampylus formosanus</i> Diels.	蓬萊藤	
332. <i>Stephania cephalantha</i> Hay.	玉咲葛藤(大還魂)	"
333. <i>Stephania japonica</i> (Thunb.) Miers	千金藤(金線吊烏龜)	"
334. <i>Stephania tetrandra</i> S. Moore	石蟾蜍	"
63. Saururaceae	三白草科	
335. <i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	蕺菜(臭腥草)	食用, 藥用
336. <i>Saururus chinensis</i> (Lour.) Baill.	三白草	藥用

學 名	中 名	用 途
64. Piperaceae		
337. <i>Peperomia japonica</i> Makino	胡椒科	
338. <i>Piper arboricola</i> DC.	椒草	藥用
339. <i>Piper hirsuta</i> (Choisy) Ohwi.	薄葉風藤	"
65. Chloranthaceae	風藤	
340. <i>Chloranthus oldhami</i> Solms.	金粟蘭科	蛇藥
341. <i>Sarcandra glabra</i> (Thunb.) Nakai	台灣及己(四葉蓮)	
	草珊瑚(紅果金粟蘭 接骨木)	觀賞
66. Aristolochiaceae	馬兜鈴科	
342. <i>Aristolochia shimadai</i> Hay.	台灣馬兜鈴(痢藥草)	藥用
343. <i>Asarum albomaculatum</i> Hay.	白斑細辛	
344. <i>Asarum infrapurpureum</i> Hay.	裏紫細辛	
345. <i>Asarum macranthum</i> Hook. f.	大花細辛(馬蹄香)	藥用
346. <i>Asarum taitonensis</i> Hay.	大屯細辛	"
67. Actinidiaceae	獮猴桃科	
347. <i>Actinidia arisanensis</i> Hay.	阿里山獮猴桃	果實
348. <i>Actinidia callosa</i> Lindl. var. <i>formosana</i> Finet & Gagnep.	台灣獮猴桃	"
349. <i>Saurauia oldhamii</i> Hemsl.	水冬哥(水冬瓜)	薪材
68. Theaceae	茶科	
350. <i>Adinandra formosana</i> Hay.	紅淡	觀賞
351. <i>Camellia tenuifolia</i> (Hay.) Cohen-Stuart	細葉山茶	"
352. <i>Cleyera japonica</i> Thunb.	楊桐	"
353. <i>Eurya acuminata</i> DC.	銳葉柃木	薪材
354. <i>Eurya chinensis</i> R. Br.	米碎柃木	"
355. <i>Eurya crenatifolia</i> (Yamamoto) Kobuski.	假柃木	觀賞
356. <i>Eurya emarginata</i> (Thunb.) Makino.	凹葉柃木	
357. <i>Eurya japonica</i> Thunb.	柃木	薪材
358. <i>Gordonia axillaris</i> (Roxb.) Dietr.	大頭茶	觀賞
359. <i>Pyrenaria shinkoensis</i> (Hay.) Keng.	烏皮茶	
360. <i>Schima superba</i> Gardn. & Champ.	木荷	用材
361. <i>Ternstroemia gymnanthera</i> (Wight & Arn.) Sprague.	厚皮香	
69. Guttiferae	金絲桃科	
362. <i>Hypericum formosanum</i> Maxim.	台灣金絲桃	藥用，觀賞
363. <i>Hypericum japonicum</i> Thunb. ex Murray	地耳草(小還魂)	藥用

學名	中名	用途
364. <i>Hypericum monogynum</i> L.	金絲桃(金線海棠)	藥白
365. <i>Hypericum pseudopetiolatum</i> R. Keller	短柄金絲桃	"
366. <i>Hypericum samponii</i> Hance	元寶草(大還魂)	"
70. Droseraceae	茅膏菜科	
367. <i>Drosera burmanni</i> Vahl	金錢草(錦地羅)	
368. <i>Drosera peltata</i> Sm. var. <i>lunata</i> Clarke	茅膏菜	食蟲植物
369. <i>Drosera spathulata</i> Lab.	小毛氈苔	"
71. Papaveraceae	罌粟科	
370. <i>Corydalis pallida</i> (Thunb.) Pers.	黃堇	
371. <i>Coryalis racemosa</i> (Thunb.) Pers.	小黃花堇	
72. Capparidaceae	山柑科(白花菜科)	
372. <i>Crateva adansonii</i> DC. subsp. <i>formosensis</i> Jacobs	魚木	藥用
73. Cruciferae	大字花科	
373. <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medic.	薺	食用
374. <i>Cardamine flexuosa</i> With.	蔊菜	"
375. <i>Cardamine scutata</i> Thunb. var. <i>formosana</i> (Hay.) Liu & Ying.	台灣碎米薺	"
376. <i>Lepidium virginicum</i> L.	獨行菜	
377. <i>Rorippa indica</i> (L.) Hiern	葥蘿(山芥菜)	
74. Hamamelidaceae	金縷梅科	
378. <i>Liquidambar formosana</i> Hance	楓香	觀賞
75. Crassulaceae	景天科	
379. <i>Bryophyllum pinnatum</i> (Lam.) Kurz	落地生根	"
380. <i>Kalanchoe spathulata</i> (Poir.) DC.	倒吊蓮	藥用
381. <i>Sedum lineare</i> Thunb.	金莉插	觀賞
76. Saxifragaceae	虎耳草科	
382. <i>Astilbe longicarpa</i> (Hay.) Hay.	落新婦	"
383. <i>Hydrangea angustipetala</i> Hay.	狹瓣八仙花	"
384. <i>Hydrangea chinensis</i> Maxim.	華八仙	"
385. <i>Hydrangea integrifolia</i> Hay. ex Matsum.	大枝掛繡球	"
386. <i>Itea oldhamii</i> Schneider	鼠刺	"
387. <i>Itea parviflora</i> Hemsl.	小花鼠刺	"
388. <i>Pileostegia viburnoides</i> Hook. f. & Thoms.	青棉花	"
389. <i>Schizophragma integrifolium</i> Oliv. var. <i>fauriei</i> (Hay.) Hay.	圓葉鑽地風	"

學名	中名	用途
77. Pittosporaceae	海桐科	
390. <i>Pittosporum tobira</i> Ait.	海桐	觀賞
78. Rosaceae	薔薇科	
391. <i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb.	龍牙草(仙鶴草)	
392. <i>Duchesnea chrysanthia</i> (Zucc. & Mor.) Miq.	台灣蛇苺	觀賞
393. <i>Duchesnea indica</i> (Andr.) Focke	蛇苺(地苺, 龍吐珠)	
394. <i>Eriobotrya deflexa</i> (Hemsl.) Nakai	山枇杷(台灣枇杷)	"
395. <i>Photinia beauverdiana</i> Schneider var. <i>notabilis</i> Rehder & Wilson	華石楠(台灣老葉兒 樹)	"
396. <i>Photinia lucida</i> (Decai.) Schneid.	台灣石楠	"
397. <i>Photinia parvifolia</i> (Pritz.) Schneid.	小葉石楠	"
398. <i>Potentilla discolor</i> Bunge	纏白草	"
399. <i>Prunus campanulata</i> Maxim.	山櫻花(銹櫻, 山櫻桃)	"
400. <i>Prunus phaeosticta</i> (Hance) Maxim.	黑星櫻	"
401. <i>Pyrus kawakamii</i> Hay.	台灣野梨	果樹
402. <i>Phaphiolepis indica</i> Lindl. var. <i>tashiroi</i> Hay. ex Matsum.	石斑木	觀賞
403. <i>Phaphiolepis umbellata</i> (Thunb.) Makino var. <i>integerrima</i> (Hook. & Arn.) Masam.	厚葉石斑木	"
404. <i>Rosa bracteata</i> Wendl.	琉球野薔薇	"
405. <i>Rosa laevigata</i> Michx.	金櫻子	"
406. <i>Rubus aculeatiflorus</i> Hay.	刺花懸鉤子	
407. <i>Rubus buergeri</i> Miq.	寒莓	
408. <i>Rubus fraxinifolius</i> Hay.	櫟葉懸鉤子	
409. <i>Rubus glandulosocalycinus</i> Hay.	腺萼懸鉤子	
410. <i>Rubus nagasawanus</i> Koidz.	粗毛懸鉤子	
411. <i>Rubus parvifolius</i> L.	紅梅消(茅菜)	果可食
412. <i>Rubus pinfaensis</i> Lev. & Van.	鬼懸鉤子(紅毛懸鉤子)	
413. <i>Rubus pinnatisepalus</i> Hemsl.	羽萼懸鉤子	
414. <i>Rubus piptopetalus</i> Hay. ex Koidz.	老虎刺(虎婆刺)	
415. <i>Rubus shinkoensis</i> Hay.	雙葉懸鉤子	
416. <i>Rubus swinhonis</i> Hance	斯氏懸鉤子	
417. <i>Rubus taiwanianus</i> Matsum.	刺莓	
418. <i>Rubus trianthus</i> Focke	苦懸鉤子	
79. Leguminosae	豆科	
419. <i>Acacia confusa</i> Merr.	相思樹	柴薪

學名	中名	用途
420. <i>Aeschynomene indica</i> L.	合萌(田皂角)	
421. <i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	合歡	觀賞
422. <i>Alysicarpus vaginalis</i> (L.) DC.	煉莢豆(山地豆)	藥用
423. <i>Bauhinia championii</i> Benth.	菊花木	觀賞
424. <i>Caesalipina crista</i> L.	搭肉刺	
425. <i>Canavalia cathartica</i> Thou.	小果刀豆	
426. <i>Cassia mimosoides</i> L.	假含著草(山扁豆)	
427. <i>Cassia occidentalis</i> L.	望江南(羊角豆)	
428. <i>Cassia tora</i> L.	決明(大山土豆)	代茶
429. <i>Crotalaria albida</i> Heyne ex Roth	響鈴豆	
430. <i>Crotalaria ferruginea</i> Grah. ex Benth.	假地藍(野生花)	
431. <i>Crotalaria linifolia</i> L. f.	密葉豬屎豆	
432. <i>Crotalaria pallida</i> Ait.	黃野百合	
433. <i>Dalbergia rubiginosa</i> Roxb.	藤黃檀	觀賞
434. <i>Desmodium candatum</i> (Thunb.) DC.	小槐花(味噌草,拿身草)	殺蟲防腐
435. <i>Desmodium gangeticum</i> (L.) DC.	大葉山螞蝗	
436. <i>Desmodium heterocarpon</i> (L.) DC.	假地豆	
437. <i>Desmodium heterophyllum</i> (Willd.) DC.	變葉山螞蝗	
438. <i>Desmodium laxiflorum</i> DC.	疏花山螞蝗(大葉拿身草)	
439. <i>Desmodium laxum</i> DC. subsp. <i>laterale</i> (Schindler) Ohashi.	琉球山螞蝗	
440. <i>Desmodium triflorum</i> (L.) DC.	三點金草(蠅翅草)	
441. <i>Dumasia bicolor</i> Hay.	台灣山黑扁豆	
442. <i>Erythrina variegata</i> L. var. <i>orientalis</i> (L.) Merr.	刺桐	觀賞
443. <i>Euchresta formosana</i> (Hay.) Ohwi	山豆根	"
444. <i>Indigofera suffruticosa</i> Mill.	野木藍(野青樹)	顏料
445. <i>Kummerowia striata</i> (Thunb.) Schindler	雞眼草	藥用
446. <i>Lespedeza cuneata</i> (Dumont d. Cours.) G. Don.	鐵掃帚(千里光)	"
447. <i>Lespedeza pubescens</i> Hay.	毛胡枝子	
448. <i>Lespedeza virgata</i> (Thunb.) DC.	細梗胡枝子	
449. <i>Leucaena glauca</i> (L.) Benth.	銀合歡	
450. <i>Maackia floribunda</i> (Miq.) Takeda	台灣馬鞍樹(島槐)	
451. <i>Medicago lupulina</i> L.	天藍苜蓿	
452. <i>Medicago polymorpha</i> L.	苜蓿(南苜蓿,刺球苜蓿)	

學 名	中 名	用 途
453. <i>Millettia reticulata</i> Benth.	雞血藤(老荆藤)	觀賞
454. <i>Pithecellobium lucidum</i> Benth.	領垂豆(糙毛豆)	"
455. <i>Pueraria montana</i> (Lour.) Merr.	山葛	根可食
456. <i>Rhynchosia volubilis</i> Lour.	鹿藿	藥用
457. <i>Sesbania grandiflora</i> (L.) Pers.	大花田菁	綠肥
458. <i>Sesbania sesban</i> (L.) Merr.	印度田菁	"
459. <i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Moench	鳥嘴豆(四子野豌豆)	
460. <i>Vigna luteola</i> (Jacq.) Benth.	長葉豇豆	
461. <i>Vigna minima</i> (Roxb.) Ohwi & Ohashi	小豇豆	
462. <i>Vigna umbellata</i> (Thunb.) Ohwi & Ohashi	赤小豆(飯豆,蛋白豆)	
80. Oxalidaceae	酢醬草科	
463. <i>Oxalis corniculata</i> L.	酢醬草	觀賞
464. <i>Oxalis corymbosa</i> DC.	紫花酢醬草	"
81. Geraniaceae	牻牛兒苗(香葉草)科	觀賞
465. <i>Geranium nepalense</i> Sweet var. <i>thunbergii</i>	牻牛兒苗	
82. gii (Sieb. et Zucc.) Kudo		
Euphorbiaceae	大戟科	
466. <i>Alchornea trewioides</i> (Benth.) Muell.-Arg. var. <i>formosae</i> (Muell.-Arg.) Pax & Hoffm.	台灣山麻桺	
467. <i>Antidesma japonicum</i> Sieb. & Zucc. var. <i>densiflorum</i> Huru.	密花五月茶	
468. <i>Bischofia javanica</i> Blume	重陽木(茄冬)	觀賞
469. <i>Breynia formosana</i> (Hay.) Hay.	台灣山漆莖	
470. <i>Breynia officinalis</i> Hemsl.	紅仔珠	藥用
471. <i>Bridélia balansae</i> Tutch.	刺杜密	薪炭
472. <i>Euphorbia hirta</i> L.	乳汁草	
473. <i>Euphorbia thymifolia</i> L.	千根草	
474. <i>Glochidion acuminatum</i> Muell.- Arg.	裏白饅頭果	柴薪
475. <i>Glochidion lanceolatum</i> Hay.	披針饅頭果	"
476. <i>Glochidion puberum</i> (L.) Hutch	紅毛饅頭果	"
477. <i>Glochidion rubrum</i> Blume	細葉饅頭果	"
478. <i>Glochidion zeylanicum</i> (Gaertn.) A. Juss.	錫蘭饅頭果	"
479. <i>Liodendron formosanum</i> (Kane. & Sasaki) Keng	台灣假黃楊	"
480. <i>Macaranga tanarius</i> (L.) Muell.-Arg.	血桐	觀賞，用材

學名	中名	用途
481. <i>Mallotus japonicus</i> (Thunb.) Muell.-Arg.	野桐	皮藥用
482. <i>Mallotus paniculatus</i> (Lam.) Muell.-Arg.	白匏子	觀賞
483. <i>Mallotus philippensis</i> (Lam.) Muell.-Arg.	粗糠柴	藥用
484. <i>Mallotus repandus</i> (Willd.) Muell.-Arg.	扛香藤	"
485. <i>Melanolepis multiglandulosa</i> (Reinw.) Reich. & Zoll.	蟲屎	"
486. <i>Mercurialis leiocarpa</i> Sieb. & Zucc.	山欖	
487. <i>Phyllanthus multiflorus</i> Willd.	多花油柑(白仔)	
488. <i>Phyllanthus urinaria</i> L.	葉下珠(珠仔草)	
489. <i>Phyllanthus virgatus</i> Forst. f.	細葉油柑	
490. <i>Picinus communis</i> L.	蓖麻	
491. <i>Sapium discolor</i> Muell.-Arg.	白桕	滑油
492. <i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb.	烏桕	薪材
493. <i>Securinega virosa</i> (Roxb.) Pax & Hoffm.	密花葉底珠(密花市葱)	製臘 觀賞
83. Daphniphyllaceae	虎皮楠科	
494. <i>Daphniphyllum glaucescens</i> Blume subsp. <i>oldhamii</i> (Hemsl.) Huang	奧氏虎皮楠	用材
494. <i>Daphniphyllum glaucescens</i> Blume subsp. <i>oldhamii</i> var. <i>kengii</i> (Huru.) Huang	耿氏虎皮楠	觀賞
84. Rutaceae	芸香科	
495. <i>Evodia lepta</i> (Spreng.) Merr.	三脚龜	觀賞
496. <i>Evodia meliaeifolia</i> (Hance) Benth.	臭辣樹(賊仔樹)	用材
497. <i>Evodia merrillii</i> Kane. & Sasaki ex Kane	山刈葉	藥用
498. <i>Glycosmis citrifolia</i> (Willd.) Lindl.	石苓舅(山橘)	用材
499. <i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack.	月橘(十里香)	觀賞
500. <i>Severinia buxifolia</i> (Poir.) Tenore	烏柑(山柑仔)	藥用
501. <i>Zanthoxylum ailanthoides</i> Sieb. & Zucc.	食茱萸	"
502. <i>Zanthoxylum nitidum</i> (Roxb.) DC.	崖椒(雙面刺)	"
503. <i>Zanthoxylum scandens</i> Blume	藤花椒	"
85. Meliaceae	棟科	
504. <i>Melia azedarach</i> L.	棟(苦棟)	用材
86. Malpighiaceae	黃禡花科	
505. <i>Hiptage benghalensis</i> (L.) Kurz	猿尾藤	
87. Polygalaceae	遠志科	

學名	中名	用途
506. <i>Polygala polyfolia</i> Presl	無柄花瓜子金	
88. Anacardiaceae	漆樹科	
507. <i>Rhus semalata</i> Murr. var. <i>roxburghiana</i> DC.	羅氏塗膚木(塗鹽，山塗青)	鹽的代用品
508. <i>Rhus succedanea</i> L.	山漆(木蠟樹)	用材
509. <i>Rhus toxicodendron</i> L.	野葛	有毒
89. Aceraceae	槭樹科	
510. <i>Acer kawakamii</i>	尖葉槭	觀賞
511. <i>Acer serrulatum</i> Hay.	青楓	"
90. Sapindaceae	無患子科	
512. <i>Cardiospermum halicacabum</i> L.	倒地鈴(白花草, 風船葛)	藥用
513. <i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq.	車桑子	防砂
514. <i>Eurycoma longifolia</i> (Levl.) Rehd. & Hand.-Mazz.	賽樂華	觀賞
515. <i>Sapindus mukorossii</i> Gaertn.	無患子	肥皂代用品
91. Sabiaceae	清風藤科	
516. <i>Meliosma rhoifolia</i> Maxim.	山豬肉	用材
517. <i>Meliosma rigida</i> Sieb. & Zucc.	筆羅子	"
518. <i>Meliosma squamulata</i> Hance	綠樟	觀賞
92. Aquifoliaceae	冬青科	
519. <i>Ilex asprella</i> (Hook. & Arn.) Champ.	燈籠花(烏雞骨)	"
520. <i>Ilex ficoidea</i> Hemsl.	台灣糊櫻	"
521. <i>Ilex formosana</i> Maxim.	糊櫻	"
522. <i>Ilex hayataiana</i> Loes.	旱田氏冬青	"
523. <i>Ilex micrococca</i> Maxim.	朱紅水木	"
524. <i>Ilex pubescens</i> Hook. & Arn.	密毛假黃楊	"
525. <i>Ilex rotunda</i> Thunb.	鐵冬青	"
526. <i>Ilex uraiensis</i> Mori & Yamamoto	烏來冬青	"
527. <i>Ilex warburgii</i> Loes.	華氏冬青	"
93. Celastraceae	衛矛科	
528. <i>Euonymus echinatus</i> Wall.	刺果衛矛	"
529. <i>Genitia carnosus</i> (Hemsl.) Li & Hou	厚葉衛矛	"
94. Staphyleaceae	省沽油科	
530. <i>Euscaphis japonica</i> (Thunb.) Kanitz	野鵝椿	"
531. <i>Turpinia formosana</i> Nakai	山香圓	"
532. <i>Turpinia ternata</i> Nakai	三葉山香圓	"

學名	中名	用途
95. Buxaceae	黃楊科	
533. <i>Buxus microphylla</i> Sieb. & Zucc. var. <i>intermedia</i> (Kane.) Li	台灣黃楊	觀賞
96. Rhamnaceae	鼠李科	
534. <i>Berchemia formosana</i> Schneider	台灣黃繩藤	藥用
535. <i>Berchemia lineata</i> (L.) DC.	小葉黃繩藤	"
536. <i>Paliurus ramosissimus</i> (Lour.) Poir.	馬甲子	"
537. <i>Rhamnus formosana</i> Matsum.	桶鈎藤	水桶繩
538. <i>Rhamnus nakaharai</i> (Hay.) Hay.	中原氏鼠李	
539. <i>Ventilago leiocarpa</i> Benth.	光果翼核木	
97. Vitaceae	葡萄科	
540. <i>Ampelopsis brevipedunculata</i> (Maxim.) Trautv.	山葡萄	
541. <i>Ampelopsis cantoniensis</i> (Hook. & Arn.) Planch.	廣東山葡萄	觀賞
542. <i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagnep.	虎葛	"
543. <i>Cissus peroclada</i> Hay.	翼莖粉藤	"
544. <i>Cissus repens</i> Lam.	粉藤	"
545. <i>Cissus repens dentatum</i> (Hay.) Li	三角鼈草	"
546. <i>Tetrastigma umbellatum</i> (Hemsl.) Nakai	台灣崖爬藤	"
547. <i>Vitis kelungensis</i> Momiyama	基隆葡萄	"
548. <i>Vitis thunbergii</i> Sieb. & Zucc. var. <i>taiwaniana</i> Lu	小葉葡萄	"
98. Elaeocarpaceae	杜英科	
549. <i>Elaeocarpus japonicus</i> Sieb. & Zucc.	薯豆	用材
550. <i>Elaeocarpus sylvestris</i> (Lour.) Poir.	杜英	"
99. Tiliaceae	田麻科	
551. <i>Corchorus capsularis</i> L.	黃麻	纖維
552. <i>Corchorus olitorius</i> L.	山麻	"
553. <i>Grewia rhombifolia</i> Kane. & Sasaki	菱葉捕魚木	
554. <i>Triumfetta bartramia</i> L.	垂按草	
100. Malvaceae	錦葵科	
555. <i>Abelmoschus moschatus</i> (L.) Medicus	香葵	種子取香油
556. <i>Abutilon theophrasti</i> Medicus	苘麻	
557. <i>Hibiscus taiwanensis</i> Hu	山芙蓉	觀賞
558. <i>Hibiscus tiliaceus</i> L.	黃槿	"

學 名	中 名	用 途
559. <i>Malvastrum coromandelianum</i> (L.) Garcke	賽葵	觀賞
560. <i>Sida acuta</i> Burm. f.	細葉金牛時花	
561. <i>Sida cordifolia</i> L.	圓葉金牛時花	
562. <i>Sida rhombifolia</i> L.	金牛時花	
563. <i>Urena lobata</i> L.	野棉花(虱母草)	
564. <i>Urena procumbens</i> L.	梵天花(三角楓)	
101. Sterculiaceae	梧桐科	
565. <i>Helicteres angustifolia</i> L.	山芝麻	藥用
566. <i>Melochia corchorifolia</i> L.	野路葵	
102. Thymelaeaceae	瑞香科	
567. <i>Daphne arisanensis</i> Hay.	台灣瑞香	觀賞
568. <i>Daphne odora</i> Thunb. var. <i>at rocaulis</i> Rehder	白花瑞香	"
569. <i>Wikstroemia indica</i> C. A. Mey.	南嶺蕘花	
103. Elaeagnaceae	胡頹子科	
570. <i>Elaeagnus formosana</i> Nakai	台灣胡頹子	果可食
571. <i>Elaeagnus glabra</i> Thunb.	藤胡頹子	"
572. <i>Elaeagnus oldhamii</i> Maxim.	檀梧	"
573. <i>Elaeagnus thunbergii</i> Serv.	鄧氏胡頹子	"
104. Flacourtiaceae	大風子科	
574. <i>Idesia polycarpa</i> Maxim.	山桐子	用材
575. <i>Scopolia oldhamii</i> Hance	魯花樹(台灣刺絛)	觀賞
105. Violaceae	堇菜科	
576. <i>Viola caespitosa</i> D. Don	箭葉堇菜	"
577. <i>Viola diffusa</i> Ging	茶匙黃	"
578. <i>Viola formosana</i> Hay.	台灣堇菜	"
579. <i>Viola nagasawae</i> Makino & Hay.	台北堇菜	"
580. <i>Viola verecunda</i> A. Gray.	箭堇菜	"
106. Passifloraceae	西番蓮科	
581. <i>Passiflora edulis</i> Sims.	百香果(時計,雞蛋果)	果可食
107. Elatinaceae	溝繁縷科	
582. <i>Elatine triandra</i> Schkuhr	三蕊溝繁縷	
108. Begoniaceae	秋海棠科	
583. <i>Begonia aptera</i> Bl.	圓果秋海棠	
584. <i>Begonia formosana</i> (Hay.) Masam.	水鴨腳	
109. Cucurbitaceae	瓜(葫蘆)科	

學名	中名	用途
585. <i>Diplocyclos palmatus</i> (L.) C. Jeffrey	雙輪瓜	藥用
586. <i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Makino	絞股藍	
587. <i>Melothria heterophylla</i> (Lour.) Cogn.	變葉馬兜兒	
588. <i>Melothria moderaspatana</i> (L.) Cogn.	倒吊金鐘(天花)	藥用
589. <i>Melothria mucronata</i> (Blume) Cogn.	黑果馬兜兒(山刺瓜)	"
590. <i>Momordica charantia</i> L.	苦瓜	食用
591. <i>Momordica cochinchinensis</i> (Lour.) Spreng	木鼈子(臭屎瓜)	藥用
592. <i>Thladiantha nudiflora</i> Hemsl. ex Forb. & Hemsl.	青牛膽	"
593. <i>Trichosanthes bracteata</i> (Lam.) Voigt	槭葉括樓	
594. <i>Trichosanthes cucumeroides</i> (Seringe) Maxim. ex Fr. & Sav.	師古草(王瓜)	"
594. <i>Trichosanthes cucumeroides</i> var. <i>formosana</i> (Hay.) Kitamura	台灣師古草	"
594. <i>Trichosanthes cucumeroides</i> var. <i>steno-carpa</i> Honda	狹果師古草	"
595. <i>Trichosanthes homophylla</i> Hay.	芋葉括樓	"
110. Lythraceae	千屈菜科	
596. <i>Lagerstroemia subcostata</i> Koehne	九芎(拘那花)	用材
597. <i>Rotala indica</i> (Willd.) Koehne var. <i>uliginosa</i> (Miq.) Koehne	印度水豬母乳	
598. <i>Rotala rotundifolia</i> (Wall. ex Roxb.) Koehne	水豬母乳	藥用
111. Myrtaceae	桃金娘科	
599. <i>Rhodomyrtus tomentosa</i> (Ait.) Hassk.	桃金娘	果可食
600. <i>Syzygium buxifolium</i> Hook. & Arn.	小葉赤楠(山烏珠)	觀賞
601. <i>Syzygium formosanum</i> (Hay.) Mori	台灣赤楠	用材
602. <i>Syzygium jambas</i> (L.) Alston	蒲桃(香果)	果樹
112. Melastomataceae	野牡丹科	
603. <i>Barthea formosana</i> Hay.	深山野牡丹	觀賞
604. <i>Blastus cochinchinensis</i> Lour.	柏拉木	"
605. <i>Bredia oldhamii</i> Hook. f.	金石榴	"
606. <i>Melastoma candidum</i> D. Don	野牡丹	"
607. <i>Osbeckia chinensis</i> L.	金錦香	"
608. <i>Sarcopyramis delicata</i> C. B. Robins.	肉穗野牡丹	"

學 名	中 名	用 途
113. Onagraceae		
609. <i>Ludwigia pilobioides</i> Maxim.	柳葉菜科 黃花水丁香(假柳葉菜)	觀賞
610. <i>Ludwigia octovalvia</i> (Jacq.) Raven	水丁香	"
611. <i>Ludwigia peploides</i> (HBK.) Raven ssp. <i>stipulacea</i> (Ohwi) Raven	水龍(過江龍)	"
114. Haloragaceae		
612. <i>Haloragis micrantha</i> (Thunb.) R. Br.	小二仙草科 小二仙草	
613. <i>Myriophyllum spicatum</i> L.	聚藻(金魚藻)	"
115. Cornaceae		
614. <i>Aucuba chinensis</i> Benth.	山茱萸科 桃葉珊瑚	
615. <i>Cornus kousa</i> Buerger. ex Miq.	四照花	"
116. Araliaceae		
616. <i>Acanthopanax trifoliatus</i> (L.) Merr.	五加科 三葉五加(三加皮)	觀賞, 藥用
617. <i>Aralia bipinnata</i> Blanco	裏百根木	觀賞
618. <i>Aralia decaisneana</i> Hance	刺楡(鵝不踏)	"
619. <i>Dendropanax pelticidopunctata</i> (Hay.) Kane, ex Kane & Hatu.	台灣樹參	"
620. <i>Hedera rhombea</i> (Miq.) Bean var. <i>for-</i> <i>mosana</i> (Nakai) Li	台灣常春藤	"
621. <i>Schefflera arboricola</i> Hay.	鵝掌藥	"
622. <i>Schefflera octophylla</i> (Lour.) Harms	鵝掌柴(江某, 鴨腳樹)	用材
623. <i>Tetrapanax papyriferus</i> (Hook.) K. Koch	脫通木(通草)	造紙
117. Umbelliferae		
624. <i>Angelica dahurica</i> (Fisch.) Benth. & Hook. var. <i>formosana</i> (Boiss.) Yen	繖形科 野當歸	藥用
625. <i>Centella asiatica</i> (L.) Urban	雷公根(蚶殼草)	"
626. <i>Cnidium monnierii</i> (L.) Gussone var. <i>formosanum</i> (Yabe) Kitagawa	台灣芎藷	"
627. <i>Hydrocotyle formosana</i> Masamune	台灣天胡荽(變地錦)	"
628. <i>Hydrocotyle nepalensis</i> Hook.	乞食碗	
629. <i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> Lam.	天胡荽	
630. <i>Oenanthe javanica</i> (Blume) DC.	水芹菜	嫩莖葉可食
631. <i>Pimpinella diversifolia</i> DC.	三葉茴芹	"
632. <i>Sanicula lamelligera</i> Hance	三葉山芹菜	
633. <i>Sium suave</i> Walt.	細葉零子人參	
634. <i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	竊衣	

學 名	中 名	用 途
118. Ericaceae		
635. <i>Gaultheria leucocarpa</i> Bl. forma <i>cummingiana</i> (Vidal) Sleumer	杜鵑花科 白珠樹	果可食
636. <i>Lyonia ovalifolia</i> (Wall.) Drude	南燭	觀賞
637. <i>Pieris taiwanensis</i> Hay.	台灣馬醉木	"
638. <i>Rhododendron ellipticum</i> Maxim.	西施花(青紫木)	"
639. <i>Rhododendron hyperythrum</i> Hay.	紅星杜鵑	"
640. <i>Rhododendron longiperulatum</i> Hay.	大屯杜鵑(大屯滿山紅)	"
641. <i>Rhododendron mariesii</i> Hemsl. & Wilson	守城滿山紅	"
642. <i>Rhododendron nakaharai</i> Hay.	中原氏杜鵑	"
643. <i>Rhododendron oldhamii</i> Maxim	金毛杜鵑	"
644. <i>Vaccinium bracteatum</i> Thunb.	米飯花	"
645. <i>Vaccinium randaiense</i> Hay.	巒大越橘	"
646. <i>Vaccinium wrightii</i> Gray	大葉越橘	"
119. Myrsinaceae	紫金牛科	
647. <i>Ardisia chinensis</i> Benth.	華紫金牛	"
648. <i>Ardisia cornudentata</i> Mez	玉山紫金牛	"
649. <i>Ardisia crenata</i> Sims	珠砂根(鐵雨傘)	觀賞, 藥用
650. <i>Ardisia crispa</i> (Thunb.) DC. var. <i>dielsii</i> (Lev) Walker	台灣百兩金(山豆根) 、玉蘭草)	觀賞
651. <i>Ardisia pusilla</i> DC.	輪葉紫金牛	"
652. <i>Ardisia quinquegona</i> Bl.	小葉樹杞	"
653. <i>Ardisia sieboldii</i> Miq.	樹杞	觀賞, 柴薪, 藥用
654. <i>Maesa japonica</i> (Thunb.) Moritzi	山桂花(望山槁)	觀賞, 藥用
655. <i>Maesa tenera</i> Mez	台灣山桂花	藥用
656. <i>Myrsine sequinii</i> Lev	大明橘	
120. Primulaceae	報春花科	
657. <i>Anagallis arvensis</i> L.	瑠璃繁縷	觀賞
658. <i>Lysimachia ardisipides</i> Masam.	台灣排香	"
659. <i>Lysimachia formosana</i> Honda	蓬萊珍	"
660. <i>Lysimachia fortunei</i> Maxim.	星宿菜	"
661. <i>Lysimachia japonica</i> Thunb.	小茄	藥用
662. <i>Stimpsonia chamaedryoides</i> Wright ex Gray	施丁草	觀賞
121. Plumbaginaceae	藍雪科	
663. <i>Plumbago zeylanica</i> L.	烏面馬(白花藤)	藥用

學名	中名	用途
711. <i>Hedyotis diffusa</i> Willd.	定經草(珠仔草)	
712. <i>Hedyotis lindleyana</i> Hook. ex Wight & Arn. var. <i>glabricalycina</i> (Honda) Hara	台灣涼喉茶	
713. <i>Hedyotis tenelliflora</i> Bl.	細葉龍吐珠	
714. <i>Hedyotis uncinella</i> Hook. & Arn.	狗骨消(長節耳草)	觀賞
715. <i>Lasianthus japonicus</i> Miq.	日本雞屎樹	"
716. <i>Lasianthus microstachys</i> Hay.	薄葉雞屎樹	"
717. <i>Lasianthus abliquinervis</i> Merr.	雞屎樹	"
718. <i>Lasianthus plagiophyllus</i> Hance	圓葉雞屎樹	"
719. <i>Morinda umbellata</i> L.	羊角藤	"
720. <i>Mussaenda parviflora</i> Matsum.	玉葉金花	"
721. <i>Ophiorrhiza hayatana</i> Ohwi.	早田氏蛇根草	"
722. <i>Ophiorrhiza japonica</i> Bl.	蛇根草	"
723. <i>Paederia cavalerier</i> Lev.	毛雞屎藤	"
724. <i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr.	牛皮凍(雞屎藤, 仁骨蛇, 臭腥藤)	觀賞, 藥用
725. <i>Psychotria rubra</i> (Lour.) Poir.	九節木(牛屎鳥, 青龍吐霧)	"
726. <i>Psychotria serpens</i> L.	柃壁龍(風不動藤)	"
727. <i>Randia cauthoides</i> Champ. ex Benth.	台北茜草樹	"
728. <i>Randia cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.	茜草樹(龍蝦)	"
729. <i>Randia sinensis</i> (Lour.) Roem. & Schult.	華茜草樹	"
730. <i>Randia spinosa</i> (Thunb.) Poir.	對面花	"
731. <i>Tricalysia dubia</i> (Lindl.) Ohwi.	狗骨仔	"
732. <i>Wendlandia formosana</i> Cowan	水金京	用材
131. Convolvulaceae	旋花科	
733. <i>Cuscuta australis</i> R. Br.	菟絲子	觀賞
734. <i>Dichondra micrantha</i> Urban	馬蹄金	"
735. <i>Erycibe henryi</i> Prain	亨利氏伊立基藤	"
736. <i>Ipomoea acuminata</i> (Vahl) Roem. & Schult.	銳葉牽牛	"
737. <i>Ipomoea aquatica</i> Forsk.	蕹菜(草菜)	食用
738. <i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.	甘藷(地瓜)	"
739. <i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet	番仔藤(槭葉牽牛)	觀賞
740. <i>Ipomoea sinensis</i> (Desr.) Choisy	白花牽牛	"
741. <i>Merremia gemella</i> (Burm. f.) Hall. f.	菜樂藤	"

學名	中名	用途
132. Boraginaceae		
742. <i>Bothriospermum tenellum</i> (Horn.) Fischer & Meyer	紫草科 細葉子草	
743. <i>Cordia dichotoma</i> Forst. f.	破布子	果可食，用材
744. <i>Ehretia dicksonii</i> Hance	破布烏	用材
745. <i>Ehretia longiflora</i> Champ. ex Benth.	長葉厚殼樹(山檳榔)	觀賞
746. <i>Ehretia resinosa</i> Hance.	恒春厚殼樹	用材
747. <i>Ehretia thyrsiflora</i> (Sieb. & Zucc.) Nakai.	厚殼樹	"
133. Verbenaceae	馬鞭草科	
748. <i>Callicarpa formosana</i> Rolfe	杜虹花	觀賞
749. <i>Callicarpa japonica</i> Thunb.	女兒茶	茶代用品
750. <i>Callicarpa kochiana</i> Makino	長葉紫珠(鬼紫珠)	觀賞
751. <i>Callicarpa longissima</i> (Hemsl.) Merr.	長葉紫珠	"
752. <i>Callicarpa pilosissima</i> Maxim.	細葉紫珠(銳葉紫珠)	"
753. <i>Clerodendrum canescens</i> Wall.	白毛臭牡丹	"
754. <i>Clerodendrum cyrtophyllum</i> Turcz.	大青(臭腥公)	觀賞，藥用
755. <i>Clerodendrum inerme</i> (L.) Gaertn.	苦林盤(白花苦林盤)	觀賞
756. <i>Clerodendrum paniculatum</i> L.	龍船花	"
757. <i>Clerodendrum philippinum</i> Schauer	臭茉莉	"
758. <i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb.	海州常山(山豬朶)	"
759. <i>Premna microphylla</i> Turcz.	臭黃荆(小葉魚臭木)	觀賞，用材
760. <i>Stachytarpheta jamaicensis</i> (L.) Vahl.	長穗木(木馬鞭)	觀賞
761. <i>Verbena officinalis</i> L.	馬鞭草(鐵馬鞭)	藥用
762. <i>Vitex quinata</i> (Lour.) F. N. Williams	山埔姜(蘇仔，烏甜樹)	用材
763. <i>Vitex negundo</i> L.	黃荆(捕姜仔，埔荆茶)	藥用
134. Callitrichaceae	水馬齒科	
764. <i>Callitriche japonica</i> Engelm. ex Heheln	日本水馬齒	
765. <i>Callitriche verna</i> L.	水馬齒	
135. Labiate	唇形科	
766. <i>Ajuga bracteosa</i> Wall.	散血草(有苞筋骨草)	藥用
767. <i>Anisomeles indica</i> (L.) Ktze.	金劍草(魚針草)	"
768. <i>Clinopodium gracile</i> (Benth.) Ktze.	塔花(光風輪菜)	"
769. <i>Clinopodium umbrosum</i> (Bieb.) C. Koch.	風輪菜	"
770. <i>Dysophylla stellata</i> (Lour.) Benth.	水虎尾	
771. <i>Elsholtzia ciliata</i> (Thunb.) Hylander	香薷	

學名	中名	用途
772. <i>Glechoma hederacea</i> L. var. <i>grandis</i> (A. Gray) Kudo	金錢薄荷(大馬蹄草，虎咬癀)	藥用
773. <i>Hyptis rhomboides</i> Mart. & Gal.	頭花香骨草(白有骨消)	"
774. <i>Lamium chinense</i> Benth.	華野茺麻(中國續斷)	"
775. <i>Leonurus sibiricus</i> L.	益母草(茺蔚)	"
776. <i>Leucas mollissima</i> Wall. var. <i>chinensis</i> Benth	白花草	"
777. <i>Lycopus lucidus</i> Turcz. var. <i>formosana</i> Hay.	澤蘭(台灣地筍)	"
778. <i>Melissa axillaris</i> Bakh. f.	蜂草(山薄荷)	"
779. <i>Mentha canadensis</i> L.	薄荷(單列萼薄荷)	"
780. <i>Mesona procumbens</i> Hemsl.	仙草舅	仙草原料
781. <i>Mosla chinensis</i> Maxim.	乾汗草	藥用
782. <i>Mosla dianthera</i> (Buch-Ham.) Maxim.	粗鋸齒薄荷	"
783. <i>Mosla formosana</i> Maxim.	台灣乾汗草	"
784. <i>Ocimum basilicum</i> L.	零陵香(羅勃)	"
785. <i>Paraphlomis gracilis</i> (Hemsl.) Kudo	短柄舞子草(雞腳草)	"
786. <i>Perilla frutescens</i> (L.) Brit.	荳	"
787. <i>Prunella vulgaris</i> L.	夏枯草	"
788. <i>Rabdosia fastiocarpa</i> (Hay.) Hara	毛果延命草	"
789. <i>Salvia coccinea</i> Juss. ex Murr.	紅花鼠尾草(紅花紫參)	"
790. <i>Salvia japonica</i> Thunb.	紫花鼠尾草(南丹參)	"
791. <i>Salvia keitaoensis</i> Hay.	隱葉鼠尾草(溪頭紫參)	"
792. <i>Salvia nipponica</i> Miq. var. <i>formosana</i> (Hay.) Kudo	黃花鼠尾草(台灣日紫參)	"
793. <i>Scutellaria indica</i> L.	耳挖草(印度黃芩，立浪草)	"
794. <i>Scutellaria javanica</i> Jungh. var. <i>playfairi</i> (Kudo) Huang & Cheng	台灣黃芩(台灣立浪草)	"
795. <i>Scutellaria rivularis</i> Benth.	向天盞(半枝蓮)	"
796. <i>Stachys oblongifolia</i> Benth.	長葉草石蠶(方形葉水蘇)	"
797. <i>Teucrium viscidum</i> Blume	蔓苦草(小苦草)	"

學名	中名	用途
136. Solanaceae		
798. <i>Datura metel</i> L.	茄科 曼陀羅	觀賞，藥用
799. <i>Physalis angulata</i> L.	燈籠草	藥用
800. <i>Solanum aculeatissimum</i> Jacq.	刺茄	觀賞，藥用
801. <i>Solanum indicum</i> L.	印度茄	"
802. <i>Solanum lyratum</i> Thunb.	白英	"
803. <i>Solanum nigrum</i> L.	龍葵	藥用，果可食
804. <i>Solanum verbascifolium</i> L.	山煙草	藥用
·805. <i>Tubocapsicum anomalum</i> (Fr. & Sav.) Makino	龍珠	觀賞
137. Scrophulariaceae	玄參科	
806. <i>Bacopa monnieri</i> (L.) Wettst.	過長沙(百克爬草)	
807. <i>Centranthera cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.	胡麻草	
808. <i>Limnophila aromatica</i> (Lam.) Merr.	紫蘇草	香料
809. <i>Limnophila rugosa</i> (Roth) Merr.	田香草(水胡椒，大葉石龍尾)	
810. <i>Limnophila trichophylla</i> (Komarov) Komarov	石龍尾(蒲藻)	
811. <i>Lindernia procumbens</i> (Krock.) Pilcox	陌上菜	
812. <i>Mazus faurei</i> Bonati	佛氏通泉草(台灣通泉草)	藥用
813. <i>Mazus miquelianus</i> Makino	烏子草(米舅舅通泉草，蘿蔔通泉草)	"
814. <i>Mazus pumilus</i> (Brum. f.) Steenis	六角定經草	"
815. <i>Scoparia dulcis</i> L.	野甘草(金吊金英，珠仔草，金荔枝)	"
816. <i>Torenia concolor</i> Lindl. var. <i>formosana</i> Yamazaki	倒地蜈蚣	"
817. <i>Torenia flava</i> Hamit. ex Benth.	母丁香	"
818. <i>Torenia violacea</i> (Azaola Pennell	長梗花蜈蚣	"
819. <i>Vandellia antipoda</i> (L.) Yamazaki	旱田草	觀賞
820. <i>Vandellia ciliata</i> (Colsm.) Yamazaki	水丁黃(鴨母草，鴨舌癀)	"
821. <i>Vandellia cordifolia</i> (Colsm.) G. Don	心葉母草	"
822. <i>Vandellia crustacea</i> (L.) Benth.	藍豬草	"

學 名	中 名	用 途
823. <i>Vandellia tenuifolia</i> (Vah.) Haines.	薄葉見風紅	觀賞
824. <i>Vandellia viscosa</i> (Hornem.) Merr.	屏東見風紅	"
825. <i>Veronica didyma</i> Tenore	婆婆納	"
826. <i>Veronica javanica</i> Blume	爪哇水苦蕡	"
827. <i>Veronica persica</i> Poir.	台北水苦蕡	"
828. <i>Veronica undulata</i> Wall.	水苦蕡	"
138. Bignoniaceae	紫葳科	
829. <i>Radermachia sinica</i> (Hance) Hemsl.	山茱豆	"
139. Acanthaceae	爵牀科	
830. <i>Baphicacanthus cusia</i> (Nees) Bremek.	馬藍	"
831. <i>Codonacanthus pauciflorus</i> Nees.	針刺草	"
832. <i>Dicliptera chinensis</i> Juss.	華九頭獅子草	"
833. <i>Gendarussa vulgaris</i> Nees.	尖尾鳳	"
834. <i>Goldfussia formosanus</i> (Moore) Hsieh & Huang	台灣馬藍	"
835. <i>Hygrophila salicifolia</i> Nees	柳葉水蓑衣	"
836. <i>Justicia procumbens</i> L.	爵牀	"
837. <i>Lepidagathis formosensis</i> Clarke ex Hay.	台灣麟球花	"
838. <i>Parachampionella rankanensis</i> (Hay.) Bremek.	蘭嵌馬藍	"
839. <i>Peristrophe japonica</i> (Thunb.) Bremek.	九頭獅子草	"
840. <i>Staurogyne concinnula</i> (Hance) Ktze.	哈哩花	"
140. Gesneriaceae	苦苣苔科	
841. <i>Hemiboea bicornuta</i> (Hay.) Ohwi	角桐草	"
842. <i>Lysionotus pauciflorus</i> Maxim.	台灣石吊蘭	"
843. <i>Rhynchotechum discolor</i> (Maxim.) Burtt	同慈草	"
844. <i>Titanoerichum oldhamii</i> (Hemsl.) Solereder	俄氏草	"
141. Orobanchaceae	列當科	
845. <i>Aeginetia indica</i> L.	野菰	觀賞，藥用
142. Lentibulariaceae	狸藻科	
846. <i>Utricularia affinis</i> Wight	紫花挖耳草	觀賞
847. <i>Utricularia aurea</i> Lour.	黃花挖耳草	"
848. <i>Utricularia bifida</i> L.	挖耳草	藥用
849. <i>Utricularia exoleta</i> R. Br.	絲葉狸藻	

學 名	中 名	用 途
143. Plantaginaceae		
850. <i>Plantago asiatica</i> L.	車前草	觀賞，葉煮食
851. <i>Plantago major</i> L.	大車前草	藥用
144. Caprifoliaceae		
852. <i>Lonicera hypoglauca</i> Miq.	裡白忍冬	藥用
853. <i>Lonicera japonica</i> Thunb.	忍冬(金銀花)	藥用(觀賞)
854. <i>Sambucus formosana</i> Nakai	有骨消(蘋果)	觀賞
855. <i>Viburnum luzonicum</i> Rolfe	呂宋莢蒾	"
855. <i>Viburnum luzonicum</i> Rolfe var. <i>formosanum</i> (Hance) Rehder	紅子莢蒾	"
145. Valerianaceae		
856. <i>Patrinia formosana</i> Kitamura	販醬科	"
146. Campanulaceae		
857. <i>Campanumoea lancifolia</i> (Roxb.) Merr.	台灣販醬	觀賞，藥用
858. <i>Lobelia alsinoides</i> Lam.	桔梗科	觀賞
859. <i>Lobelia chinensis</i> Lour.	台灣土黨參	"
860. <i>Peracarpa carnosia</i> (Wall.) Hook. f. & Thoms.	短柄半邊蓮	"
861. <i>Pratia nummularia</i> (Lam.) A. Br. & Asch	半邊蓮(水仙花草，鎌磨仔草)	"
862. <i>Sphenoclea zeylanica</i> Gaertn.	山桔梗	"
863. <i>Wahlenbergia marginata</i> (Thunb.) A. DC.	普刺特草	"
147. Compositae		
864. <i>Adenostemma levenia</i> (L.) Ktze.	尖瓣花	"
865. <i>Ageratum conyzoides</i> L.	細葉蘭花參	"
866. <i>Ageratum houstonianum</i> Mill.	菊科	
867. <i>Ainstiae reflexa</i> Merr. var. <i>nimborum</i> Hand-Mazz.	下田菊	藥用
868. <i>Artemisia capillaris</i> Thunb.	霍香薊	"
869. <i>Artemisia princeps</i> Pamp. var. <i>orientalis</i> (Pamp.) Hara	紫花霍香薊	"
870. <i>Aster lasioclada</i> Hay.	玉山鬼督郵	"
871. <i>Bidens bipinnata</i> L.	菌藻蒿	"
872. <i>Bidens pilosa</i> L.	艾	"
873. <i>Blumea hieraciifolia</i> (D. Don) DC.	綫山白蘭	"
874. <i>Blumea lacera</i> (Burm.) DC.	鬼針	"
	白花鬼針	"
	毛將軍	"
	生毛將軍	"

學名	中名	用途
875. <i>Blumea laciniata</i> (Roxb.) DC.	裂葉艾納香	藥用
876. <i>Blumea lanceolaria</i> (Roxb.) Druce	走馬胎	"
877. <i>Blumea riparia</i> (Bl.) DC. var. <i>megacephala</i> Randeria	大頭艾納香	"
878. <i>Carpesium abrotanoides</i> L.	天名精	"
889. <i>Centipeda nepalense</i> Ness.	黃金珠	"
880. <i>Centipeda minima</i> (L.) A. Braun & Aschesson	石胡荽 (吐金草)	"
881. <i>Chrysanthemum indicum</i> L.	油菊	"
882. <i>Cirsium japonicum</i> DC. var. <i>australe</i> Kitamura.	南國小薊	觀賞
883. <i>Conyza aegyptiaca</i> (L.) Ait.	埃及假蓬	藥用
884. <i>Conyza japonica</i> (Thunb.) Less.	日本假蓬	"
885. <i>Dichrocephala bicolor</i> (Roth) Schlechtendal	茨苓菜	"
886. <i>Eclipta prostrata</i> L.	鱸腸	嫩葉可食
887. <i>Elephantopus mollis</i> H. B. K.	地膽草	藥用
888. <i>Elephantopus scaber</i> L. ssp. <i>ob lanceolata</i> Kitam.	燈豎朽	"
889. <i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC.	紫背草	"
890. <i>Erechtites valerianaefolia</i> (Wolf) DC.	飛機草	"
891. <i>Erigeron bonariensis</i> L.	野塘蒿	"
892. <i>Erigeron canadensis</i> L.	加拿大蓮	"
893. <i>Eupatorium chinense</i> L. var. <i>tozanense</i> (Hay.) Kitam.	塔山澤蘭	"
894. <i>Eupatorium formosanum</i> Hay.	台灣澤蘭	"
895. <i>Eupatorium tashiroi</i> Hay.	田代氏澤蘭	"
896. <i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kita. var. <i>formosanum</i> (Hay.) Kita.	台灣山菊	藥用，觀賞
897. <i>Gnaphalium adnatum</i> Wall. ex DC.	紅面番	藥用
898. <i>Gnaphalium affine</i> D. Don.	鼠麴草	"
899. <i>Gnaphalium hypoleucum</i> DC.	秋鼠麴草	"
900. <i>Gnaphalium japonicum</i> Thunb.	父子草 (天青地白)	"
901. <i>Grangea maderaspatana</i> (L.) Poir.	線球菊	"
902. <i>Gynura formosana</i> Kitamura.	白鳳菜	"
903. <i>Hemistepta lyrata</i> Bunge	泥胡菜	"

學名	中名	用途
904. <i>Ixeris chinensis</i> (Thunb.) Nakal. var. <i>saxatilis</i> (Kita.) Kita.	岩陰兔仔菜	藥用
905. <i>Ixeris laevigata</i> (Bl.) Schultz-Bip. ex Maxim. var. <i>oldhami</i> (Maxim.) Kitamura	刀傷草	"
906. <i>Kalimeris indica</i> (L.) Schultz.- Bip.	雞兒腸	觀賞
907. <i>Lactuca formosana</i> Maxim.	台灣山苦蕡	藥用
908. <i>Lactuca indica</i> L.	鵝仔草	"
909. <i>Lactuca sororia</i> Miq.	山苦蕡	"
910. <i>Ligularia japonica</i> (Thunb.) Less.	大吳風草	"
911. <i>Ligularia kojimae</i> Kitam.	高山橐吾	"
912. <i>Microglossa pyrifolia</i> (Lam.) Ktze.	小舌菊(蔓綿菜)	"
913. <i>Mikania cordata</i> (Burm. f) B. L. Rob.	蔓澤蘭	"
914. <i>Pertya scandens</i> Schultz.- Bip. var. <i>shimozawai</i> (Masam.) Kitam.	半高野幕	"
915. <i>Rhynchospermum verticillatum</i> Reinw.	秋分草	"
916. <i>Senecio scandens</i> Ham. ex D. Don.	蔓黃菴	"
917. <i>Senecio vulgaris</i> L.	歐洲黃菴	"
918. <i>Siegesbeckia orientalis</i> L.	豬簽	"
919. <i>Solidago virga-aurea</i> L. var. <i>leiocarpa</i> (Benth.) A. Gray.	一枝黃花	"
920. <i>Sonchus arvensis</i> L.	苦苣菜	"
921. <i>Sonchus oleraceus</i> L.	苦湩菜	"
922. <i>Sphaeromorphaea australis</i> (Less.) Kitamura	鵝不食草	"
923. <i>Taraxacum formosanum</i> Kitamura	台灣蒲公英	"
924. <i>Vernonia cinerea</i> (L.) Less.	一枝香	"
925. <i>Vernonia patula</i> (Dryand.) Merr.	嶺南野薑	"
926. <i>Wedelia biflora</i> (L. DC.	雙花蟛蜞菊	"
927. <i>Wedelia chinensis</i> (Osbeck) Merr.	蟛蜞菊	"
928. <i>Wedelia prostrata</i> (Hook. & Arn.) Hemsl	天蓬草舅	"
929. <i>Xanthium strumarium</i> L. var. <i>japonica</i> (Widder) Hara.	蒼耳	"
930. <i>Youngia japonica</i> (L.) DC.	黃鵪菜	藥用，葉煮食
148. <i>Alismataceae</i>	澤瀉科	
931. <i>Sagittaria trifolia</i> L.	慈姑(三脚剪,水芋)	根莖可食

學名	中名	用途
149. Hydrocharitaceae	水龍科	
932. <i>Blyxa auberti</i> Rich.	瘤果蕢藻	
933. <i>Blyxa echinosperma</i> (C.B. Clarke) Hook f.	台灣蕢藻	
934. <i>Blyxa japonica</i> (Miq.) Maxim. ex Asc- hers. & Gurke	日本蕢藻	
935. <i>Hydrilla verticillata</i> (L. f.) Royle	水王孫	
936. <i>Ottelia alismodes</i> (L.) Pers.	水車前草	
150. Potamogetonaceae	眼子菜科	
937. <i>Potamogeton malaianus</i> Miq.	匙葉眼子菜	
938. <i>Potamogeton octandrus</i> Poir.	眼子菜	
151. Liliaceae	百合科	
939. <i>Aletris formosana</i> (Hay.) Sasaki	台灣粉條兒菜	觀賞
940. <i>Aletris spicata</i> (Thunb.) Franchet	束心蘭	"
941. <i>Allium grayi</i> Regel	山蒜	藥用
942. <i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.	天門冬	"
943. <i>Dianella ensifolia</i> (L.) DC. ex Redouté	桔梗蘭(山管蘭)	"
944. <i>Disporopsis arisanensis</i> Hay.	阿里山假寶鐸花	觀賞
945. <i>Disporum kawakamii</i> Hay.	台灣寶鐸花	"
946. <i>Disporum shimadai</i> Hay.	山寶鐸花	"
947. <i>Heloniopsis umbellata</i> Bak.	台灣胡麻花	"
948. <i>Hemerocallis aurantiaca</i> Bak.	橙萱	"
949. <i>Lilium formosanum</i> Wallace	台灣百合	"
950. <i>Lilium longiflorum</i> Thunb. var. <i>scabrum</i> Masamune	糙莖麝香百合(鐵砲 百合)	"
951. <i>Liriope angustissima</i> Ohwi	細葉小麥門冬	觀賞，藥用
952. <i>Liriope minor</i> (Maxim.) Makino	小麥門冬	"
953. <i>Ophiopogon formosanum</i> Ohwi	台灣治階草	藥用
954. <i>Ophiopogon japonicus</i> (L. f.) Ker-Gawl.	書帶草(麥門冬)	"
955. <i>Paris polyphylla</i> Smith	七葉一枝花	藥用，觀賞
956. <i>Peliosanthes arisanensis</i> Hay.	阿里山球子筆	"
957. <i>Polygonatum alte-lobatum</i> Hay.	台灣黃精	觀賞，藥用
958. <i>Polygonatum cyrtonema</i> Hua	萎蕤	"
959. <i>Scilla sinensis</i> (Lour.) Merr.	綿裏兒(地棗子)	"
960. <i>Tricyrtis formosana</i> Bak.	台灣油點草	"
961. <i>Tricyrtis stolonifera</i> Matsum.	山油點草	"

學名	中名	用途
962. <i>Veratrum formosanum</i> Loeser. f.	台灣藜蘆	觀賞，藥用
152. Amaryllidaceae	石蒜科	"
963. <i>Crinum asiaticum</i> L.	文珠蘭	"
153. Hypoxidaceae	仙茅科	
964. <i>Curculigo capitulata</i> (Lour.) Ktze.	船仔草	觀賞
154. Dioscoreaceae	薯蕷科	
965. <i>Dioscorea alata</i> L.	大薯(罐薯，田薯)	藥用
966. <i>Dioscorea benthamii</i> Prain & Burk.	大青薯(田薯，山藥薯)	"
967. <i>Dioscorea bulbifera</i> L.	山芋(山慈姑，獨黃)	"
968. <i>Dioscorea codonopsis</i> Kamikoti	掌葉薯	"
969. <i>Dioscorea formosana</i> Knuth	台灣薯蕷	"
970. <i>Dioscorea japonica</i> Thunb. var. <i>oldhamii</i> Uline ex Knuth	細葉野山藥	"
970. <i>Dioscorea japonica</i> Thunb. var. <i>pseudojaponica</i> (Hay.) Yamamoto.	基隆野山藥(山藥薯)	"
155. <i>Dioscorea matsudai</i> Hay.	裡白葉薯榔	"
Smilacaceae	菝葜科	
972. <i>Smilax arisanensis</i> Hay.	阿里山菝葜	"
973. <i>Smilax bracteata</i> Presl	假菝葜	"
974. <i>Smilax china</i> L.	菝葜	"
975. <i>Smilax corbularia</i> Kunth	裡白菜菜	"
976. <i>Smilax glabra</i> Roxb.	禹餘糧(冷飯藤)	"
977. <i>Smilax lanceifolia</i> Roxb.	台灣土茯苓	"
978. <i>Smilax nipponica</i> Miq.	七星牛尾菜	"
979. <i>Smilax riparia</i> A. DC.	大武牛尾菜	"
156. Pontederiaceae	雨久花科	
980. <i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms	布袋蓮(鳳眼蓮，浮水蓮花)	觀賞
981. <i>Monochoria vaginalis</i> (Burm. f.) Presl	鴨舌草	藥用
157. Iridaceae	鳶尾科	
982. <i>Sisyrinchium atlanticum</i> Bickn.	庭菖蒲	觀賞
158. Burmanniaceae	水玉簪科	
983. <i>Burmannia itoana</i> Makino	紫水玉簪	
159. Juncaceae	燈心草科	
984. <i>Juncus effusus</i> L. var. <i>decipiens</i> Buchen	燈心草	觀賞
985. <i>Juncus leschenaultii</i> J. Gay ex Laharpe	錢蒲	

學 名	中 名	用 途
986. <i>Juncus wallichianus</i> Laharpe	小葉燈心草	
987. <i>Luzula multiflora</i> Lejeune	山間地楊梅	
160. Commelinaceae	鴨跖草科	
988. <i>Amischotolype chinensis</i> (N. E. Br.) E. H. Walker ex Hatusima	中國穿鞘花(東陵草)	
989. <i>Commelina auriculata</i> Bl.	耳葉鴨跖草(蓬萊鴨 跖草)	
990. <i>Commelina benghalensis</i> L.	圓葉鴨跖草(竹葉菜)	
991. <i>Commelina diffusa</i> Burm. f.	白竹仔菜	
992. <i>Commelina paludosa</i> Bl.	大葉鴨跖草(大葉竹 仔菜)	
993. <i>Cyanotis ciliata</i> (Bl.) Bakh.	毛葉鴨舌草(毛綠藍 花草)	
994. <i>Murdannia keisak</i> (Hassk.) Hand.-Mazz.	水竹葉	
995. <i>Murdannia simplex</i> (Vahl) Brenan	細竹蒿草	
996. <i>Pollia japonica</i> Thunb.	杜若	
997. <i>Pollia minor</i> (Hay.) Honda	小杜若(石竹葉)	
161. Xyridaceae	葱草科	
998. <i>Xyris formosana</i> Hay.	桃園草(黃穀精)	
162. Eriocaulaceae	穀精草科	
999. <i>Eriocaulon buergerianum</i> Koern.	連萼穀精草	
1000. <i>Eriocaulon chishingsanensis</i> Chang	七星山穀精草(台灣 穀精草)	
1001. <i>Eriocaulon cinereum</i> R. Br. var. sieboldianum (Sieb. & Zucc.) T. Koyama.	小穀精草	
1002. <i>Eriocaulon nantouense</i> Hay.	南投穀精草	
1003. <i>Eriocaulon sexangulare</i> L.	大葉穀精草	
163. Cyperaceae	莎草科	
1004. <i>Bulbostylis densa</i> (Wall.) Hand.-Mazz.	球柱草	
1005. <i>Carex baccans</i> Nees	紅果薹	
1006. <i>Carex brunnea</i> Thunb.	束草(莎草)	
1007. <i>Carex filicina</i> Nees ssp. <i>pseudofilicina</i> (Hay.) T. Koyama	紅鞘薹	
1008. <i>Carex grallatoria</i> Maxim. ssp. <i>heteroclita</i> (Franch.) T. Koyama	異型薹	
1009. <i>Carex kobomugi</i> Ohwi	海米	

學名	中名	用途
1010. <i>Carex maculata</i> Boott	寬囊果薹	
1011. <i>Carex phacota</i> Sprengel	七星斑囊果薹	
1012. <i>Carex pumila</i> Thunb.	小海米	
1013. <i>Carex satsumensis</i> Franch. & Sav.	油薹	
1014. <i>Carex sociata</i> Boott	中國宿柱薹	
1015. <i>Carex tristachya</i> Thunb. ssp. <i>pocilliformis</i> (Boott) T. Koyama	抱鱗宿柱薹	
1016. <i>Cyperus amuricus</i> Maxim.	阿穆爾莎草	
1017. <i>Cyperus compressus</i> L.	扁穗莎草(莎田草)	
1018. <i>Cyperus difformis</i> L.	異花莎草	
1019. <i>Cyperus diffusus</i> Vahl	多脈莎草	
1020. <i>Cyperus digitatus</i> Roxb.	恒春莎草	
1021. <i>Cyperus haspan</i> L.	畦畔莎草	
1022. <i>Cyperus imbricatus</i> Retz.	覆瓦狀莎草	
1023. <i>Cyperus iria</i> L.	碎米碎草	
1024. <i>Cyperus malaccensis</i> Lam.	江江鹹草	
1025. <i>Cyperus nutans</i> Vahl. ssp. <i>subprolixus</i> (Kuk.) T. Koyama	點頭莎草	
1026. <i>Cyperus pilosus</i> Vahl.	毛軸莎草	
1027. <i>Cyperus procerus</i> Rottb.	擬毛軸莎草	
1028. <i>Cyperus rotundus</i> L.	香附子	藥用
1029. <i>Cyperus serotinus</i> Rottb.	水莎草	
1030. <i>Cyperus stoloniferus</i> Retz.	粗根莖莎草	
1031. <i>Cyperus tuberosus</i> Roth.	假香附子	
1032. <i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Romer & Schult.	牛毛鬚	
1033. <i>Eleocharis congesta</i> D. Don ssp. <i>japonica</i> (Miq.) T. Koyama	針蘭	
1034. <i>Eleocharis dulcis</i> (Burm. f.) Trin. ex Henschel	荸薺(水燈心草)	
1035. <i>Eleocharis tetraquetra</i> Nees ex Wight	四角蘭	
1036. <i>Eimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl.	竹子飄拂草	
1037. <i>Fimbristylis miliacea</i> (L.) Vahl.	水氳草(日照飄拂草) 風範草)	
1038. <i>Fimbristylis schoenoides</i> (Retz.) Vahl.	嘉義飄拂草	
1039. <i>Fimbristylis sericea</i> (Poir.) R. Br.	黃色飄拂草	

學 名	中 名	用 途
1040. <i>Fimbristylis squarrosa</i> Vahl.	大屯山飄拂草	
1041. <i>Fimbristylis squarrosa</i> Vahl. ssp. <i>esquarrosa</i> (Makino) T. Koyama.	牧野氏飄拂草	
1042. <i>Fimbristylis subbispicata</i> Nees & Meyen	水葱(山蘭)	
1043. <i>Fuirena ciliaris</i> (L.) Roxb.	毛三稜	
1044. <i>Fuirena umbellata</i> Rottb.	黑珠蒿	
1045. <i>Hypolytrum nemorum</i> (Vahl.) Sprengel	台灣割雞	
1046. <i>Kyllinga brevifolia</i> Rottb.	短葉水蜈蚣	
1047. <i>Mariscus cyperinus</i> Vahl.	莎草磚子苗	
1048. <i>Mariscus sumatrensis</i> (Retz.) T. Koyama	磚子苗	
1049. <i>Pycreus flavidus</i> (Retz.) T. Koyama	球穗扁莎	
1050. <i>Pycreus polystachyos</i> (Rottb.) P. Beauvois <i>Pycreus sanguinolentus</i> (Vahl.) Nees ex	多柱扁莎 紅鱗扁莎	
1051. C. B. Clarke		
1052. <i>Rhynchospora corymbosa</i> (L.) Britton	三儉草	
1053. <i>Rhynchospora rubra</i> (Lour.) Makino	刺子莞	
1054. <i>Rhynchospora rugosa</i> (Vahl.) Gale ssp. <i>brownii</i> (Romer & Schult.) T. Koyama	布朗氏莞	
1055. <i>Schoenoplectus juncoides</i> (Roxb.) Palla	大井氏水莞	
1056. <i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) Palla ssp. <i>robustus</i> (Miq.) T. Koyama	水毛花	
1057. <i>Schoenoplectus wallichii</i> (Ness) T. Koyama	台灣水莞	
1058. <i>Scirpus ternatanus</i> Reinw. ex Miq.	大莞草	
1059. <i>Scleria levis</i> Retz.	毛果珍珠茅	
1060. <i>Scleria rugosa</i> R. Br.	皺果珍珠茅	
1061. <i>Scleria terrestris</i> (L.) Fassett.	皺生珍珠茅	
1062. <i>Torulinium odoratum</i> (L.) S. Hooper	斷節莎	
164. Gramineae	禾本科	
1063. <i>Agrostis sozanensis</i> Hay.	草山翦股颖	
1064. <i>Alopecurus aequalis</i> Sobol. var. <i>amurensis</i> (Komar.) Ohwi	看麥娘	
1065. <i>Apluda mutica</i> L.	水蕪草	
1066. <i>Arthraxon hispidus</i> (Thunb.) Makino	蓋草	
1067. <i>Arthraxon pauciflorus</i> Honda	粗梗蓋草	

學名	中名	用途
1068. <i>Arundinella setosa</i> Trin.	刺芒野古草	
1069. <i>Arundo donax</i> L.	蘆竹	
1069. <i>Arundo donax</i> L. var. <i>coleotricha</i> Hack	毛鞘蘆竹	
1070. <i>Arundo formosana</i> Hack.	台灣蘆竹	
1071. <i>Axonopus affinis</i> Chase	類地毯草	牧草
1072. <i>Bothriochloa intermedia</i> (R. Br.) A. Camus.	臭根子草	
1073. <i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng	白羊草	
1074. <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) Beauv. var. <i>luzoniense</i> (Hack.) Hara	呂宋短柄草	
1075. <i>Briza minor</i> L.	銀鱗草	
1076. <i>Calamagrostis epigeios</i> (L.) Roth	拂子茅	
1077. <i>Capillipedium kwashotensis</i> (Hay.) C. Hsu	綠島細柄草	
1078. <i>Capillipedium parviflorum</i> (R. Br.) Stapf	細柄草	
1079. <i>Cenchrus echinatus</i> L.	蒺藜草	
1080. <i>Centotheca lappacea</i> (L.) Desv.	假淡竹葉	
1081. <i>Chrysopogon aciculatus</i> (Retz.) Trin.	竹節草	
1082. <i>Coix lacryma-jobi</i> L.	薏苡	食用，藥用
1083. <i>Cymbopogon nardus</i> (L.) Rendle	香茅	香水原料
1084. <i>Cymbopogon tortilis</i> (Presl) A. Camus var. <i>goeringii</i> (Steud.) Hand.- Mazz.	橘草	
1085. <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	狗牙根	草皮
1086. <i>Cyrtococcum patens</i> (L.) A. Camus	弓果黍	
1087. <i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) Beauv.	龍爪茅	
1088. <i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koel.	升馬唐	牧草
1089. <i>Digitaria ischaemum</i> (Schreb.) Schreb ex Muhl.	止血馬唐	"
1090. <i>Digitaria radicosa</i> (Presl) Miq.	小馬唐	"
1091. <i>Digitaria violascens</i> Link	紫果馬唐	"
1092. <i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv.	稗	
1093. <i>Elensine indica</i> (L.) Gaertn.	牛筋草	藥用
1094. <i>Eragrostis amabilis</i> (L.) Wight & Arn. ex Nees	鯽魚草	

學名	中名	用途
1095. <i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Vignolo-Lutati	大畫眉草	
1096. <i>Eragrostis cumingii</i> Steud.	肯氏畫眉草	
1097. <i>Eragrostis cylindrica</i> (Roxb.) Nees	短穗畫眉草	
1098. <i>Eragrostis japonica</i> (Thunb.) Trins.	長穗畫眉草	
1099. <i>Eragrostis multicaulis</i> Steud.	多桿畫眉草	
1100. <i>Eragrostis pilosissima</i> Link	多毛知風草	
1101. <i>Eragrostis unioloides</i> (Retz.) Nees ex Steud.	牛虱草	
1102. <i>Eremochloa ophiuroides</i> (Munro) Hack.	假儉草	
1103. <i>Erianthus formosanus</i> Stapf var. <i>pollinioides</i> (Rendle) Ohwi	紫台蔗茅	
1104. <i>Eriochloa villosa</i> (Thunb.) Kunth	野黍	
1105. <i>Eustachys tener</i> (Presl) A. Camus	真穗草	
1106. <i>Hemarthria compressa</i> (L. f.) R. Br.	扁穗牛鞭草	
1107. <i>Hymenachne pseudointerrupta</i> C. Muell	膜稃草	
1108. <i>Ichnanthus vicinus</i> (F.M. Bail.) Merr.	距花黍	
1109. <i>Imperata cylindrica</i> (L.) Beauv. var. <i>major</i> (Nees) C. E. Hubb. ex Hubb. & Vaughan	白茅	藥用
1110. <i>Isachne debilis</i> Rendle	莊弱柳葉箬	
1111. <i>Isachne dispar</i> Trin.	異花柳葉箬	
1112. <i>Isachne globosa</i> (Thunb.) Ktze.	柳葉箬	
1113. <i>Isachne kunthiana</i> (Wight. & Arn.) Nees ex Steud.	肯氏柳葉箬	
1114. <i>Ischaemum nipponensis</i> Ohwi	日本柳葉箬	
1115. <i>Ischaemum aristatum</i> L.	芒穗鴨嘴草	
1116. <i>Ischaemum crassipes</i> (Steud.) Thell.	鴨嘴草	
1117. <i>Ischaemum indicum</i> (Houtt.) Merr.	印度鴨嘴草	
1118. <i>Leersia hexandra</i> Sw.	李氏禾	
1119. <i>Leptochloa chinensis</i> (L.) Nees	千金子	
1120. <i>Lophatherum gracile</i> Brougn.	淡竹葉	
1121. <i>Microstegium ciliatum</i> (Trin.) A. Camus	剛莠竹	
1122. <i>Microstegium fauriei</i> Honda	法利莠竹	
1123. <i>Microstegium glaberrimum</i> (Honda) Koidz.	短軸莠竹	

學名	中名	用途
1124. <i>Microstegium nudum</i> (Trin.) A. Camus	竹葉茅	
1125. <i>Microstegium somai</i> (Hay.) Ohwi	相馬莠竹	
1126. <i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A. Camus.	柔枝莠竹	
1127. <i>Miscanthus floridulus</i> (Labill.) Warb. ex Schum. & Lant.	五節芒	
1128. <i>Miscanthus sinensis</i> Anders. var. <i>formosanus</i> Hack.	台灣芒	
1129. ^a <i>Oplismenus compositus</i> (L.) Beauv.	竹葉草	
1129. ^b <i>Oplismenus compositus</i> (L.) Beauv. var. <i>intermedius</i> (Honda) Ohwi	大屯求米草	
1130. ^a <i>Oplismenus undulatifolius</i> (Arduino) Roem. & Schult.	求米草	
1130. ^b <i>Oplismenus undulatifolius</i> (Arduino) Roem. & Schult. var. <i>imbecillis</i> (R. Br.) Hack.	毛求米草	
1131. <i>Panicum bisulcatum</i> Thunb.	糖稷	
1132. <i>Panicum brevifolium</i> L.	短葉黍	
1133. <i>Panicum notatum</i> Retz.	心葉稷	
1134. <i>Panicum paludosum</i> Roxb.	水生黍	
1135. <i>Panicum psilopodium</i> Trin.	細柄黍	
1136. <i>Panicum repens</i> L.	鋪地黍	藥用
1137. <i>Panicum watenusa</i> Mez.	南亞黍	
1138. <i>Paspalum commersonii</i> Lam.	台灣雀稗	牧草
1139. <i>Paspalum conjugatum</i> Berg.	兩耳草	"
1140. <i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	毛花雀稗	"
1141. <i>Paspalum longifolium</i> Roxb.	長葉雀稗	"
1142. <i>Paspalum orbicularis</i> Forst.	圓果雀稗	"
1143. <i>Paspalum scrobiculatum</i> L.	鵝乸草	"
1144. <i>Paspalum thunbergii</i> Kunth ex Steud.	雀稗	"
1145. <i>Paspalum vaginatum</i> Sw.	海雀稗	"
1146. <i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) Spreng.	狼尾草	"
1147. <i>Pennisetum purpureum</i> Schumach.	象草	"
1148. <i>Phragmites karka</i> (Retz.) Trin. ex Steud.	開卡蘆	觀賞
1149. <i>Poa annua</i> L.	早熟禾	牧草

學名	中名	用途
1150. <i>Pogonatherum crinitum</i> (Thunb.) Kunth	金絲草	觀賞
1151. <i>Polypogon fugax</i> Nees	棒頭草	
1152. <i>Pseudosasa usawai</i> (Hay.) Makino & Nemoto	包籜箭竹(矢竹子)	
1153. <i>Rottboellia exaltata</i> L. f.	羅氏草	
1154. <i>Sacciolepis indica</i> (L.) Chase	囊穎草	
1154. <i>Sacciolepis indica</i> (L.) Chase var. <i>oryzetorum</i> (Makino) Ohwi	水囊穎草	
1155. <i>Setaria faberii</i> Herrm.	法氏狗尾草	
1156. <i>Setaria italica</i> (L.) Beauv.	小米	食用
1157. <i>Setaria palmifolia</i> (Koen.) Stapf	棕葉狗尾草	
1148. <i>Setaria viridis</i> (L.) Beauv.	狗尾草	
1159. <i>Sinobambusa kunishii</i> (Hay.) Nakai	台灣矢竹	
1160. <i>Sphaerocaryum malaccense</i> (Trin.) Pilger	稃蓋	
1161. <i>Sporobolus fertilis</i> (Steud.) W. D. Clayton	鼠尾粟	
1162. <i>Thyanolaena maxima</i> (Roxb.) Ktze	棕葉蘆	
1163. <i>Zoysia japonica</i> Steud.	結縷草	
165. Palmae	棕櫚科	
1164. <i>Arenga engleri</i> Beccari	山棕	
1165. <i>Daemonorops margaritae</i> (Hance)	黃藤	莖做藤俱
165. Beccari		
166. Araceae	天南星科	
1166. <i>Acorus gramineus</i> Soland.	石菖蒲(堯芷,昌陽)	
1167. <i>Alocasia cucullata</i> Schott & Endl.	台灣姑婆芋	
1168. <i>Alocasia macrorrhiza</i> (L.) Schott & Endl.	姑婆芋	
1169. <i>Arisaema formosana</i> (Hay.) Hay.	台灣天南昌	
1170. <i>Arisaema heterophyllum</i> Blume	羽葉天南星	
1171. <i>Arisaema kelung-insularis</i> Hay.	基隆天南星	
1172. <i>Arisaema ringens</i> Schott	申跋(油跋,小天南星)	
1173. <i>Colocasia formosana</i> Hay.	山芋(台灣青芋)	
1174. <i>Epipremnum pinnatum</i> (L.) Engl.	柃樹藤	
1175. <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit.	半夏(地文,三不掉)	
1176. <i>Pistia stratiotes</i> L.	大萍(大蓮,大慈萍)	

學 名	中 名	用 途
1177. <i>Pothos chinensis</i> (Raf.) Merr.	袖葉藤	
1178. <i>Typhonium divaricatum</i> (L.) Decne.	土半夏	藥用
167. Lemnaceae	浮萍科	
1179. <i>Lemna perpusilla</i> Torr.	青萍	
1180. <i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.	水萍	
1181. <i>Spirodela punctata</i> (G. F. W. Meyer) Thompson.	紫萍	
1182. <i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Wimmer.	無根萍(卵萍，水蚤 萍)	
168. Musaceae	芭蕉科	
1183. <i>Musa formosana</i> (Warb.) Hay.	台灣芭蕉(山芭蕉)	
169. Zingiberaceae	薑科	
1184. <i>Alpinia densesplicata</i> Hay.	七星月桃	觀賞，藥用
1185. <i>Alpinia formosana</i> K. Schum.	台灣月桃	"
1186. <i>Alpinia intermedia</i> Gagn.	山月桃	"
1187. <i>Alpinia japonica</i> Miq.	山薑	"
1188. <i>Alpinia oblongifolia</i> Hay.	橢圓葉月桃	"
1189. <i>Alpinia shimadai</i> Hay.	七星山薑(新竹山薑)	"
1190. <i>Alpinia speciosa</i> (Wendl.) K. Schum.	玉桃(良姜，月桃， 虎子花)	"
1191. <i>Hedychium coronarium</i> Koenig	穗花山奈(立花)	"
170. Orchidaceae	蘭科	
1192. <i>Acanthephippium sylhetense</i> Lindl.	台灣鍾馗蘭	觀賞
1193. <i>Acanthephippium unguiculatum</i> (Hay.) Fukuyama	一葉鍾馗蘭	"
1194. <i>Anoectochilus formosanus</i> Hay.	台灣金線蘭	"
1195. <i>Arundina graminifolia</i> (D. Don) Hoch- rentiner	葦草蘭(鳥仔花)	"
1196. <i>Calanthe formosana</i> Rolfe	台灣根節蘭	"
1197. <i>Calanthe graciliflora</i> Hay.	細花根節蘭	"
1198. <i>Calanthe lyroglossa</i> Reichb. f.	連翹根節蘭	"
1199. <i>Calanthe masuca</i> (D. Don) Lindl.	長距根節蘭	"
1200. <i>Calanthe triplicata</i> (Willem.) Ames	白鶴蘭	"
1201. <i>Cephalantheropsis calanthoides</i> (Ames) Liu & Su	白花肖頭蕊蘭	"
1202. <i>Cephalantheropsis gracilis</i> (Lindl.) S.	綠花肖頭蕊蘭	"

學名	中名	用途
Y. Hu		
1203. <i>Chrysoglossum ornatum</i> Bl.	台灣黃唇蘭	觀賞
1204. <i>Cymbidium sinense</i> Willd.	報歲蘭	"
1205. <i>Eria ovata</i> Lindl.	大脚筒蘭	"
1206. <i>Eria philippinensis</i> Ames	樹絨蘭	"
1207. <i>Galeola altissima</i> (Bl.) Reichb. f.	蔓莖山珊瑚	"
1208. <i>Goodyera procera</i> (Ker-Gawl.) Hook. f.	穗花斑葉蘭	"
1209. <i>Habenaria dentata</i> (Sw.) Schltr	白鳳蘭	"
1210. <i>Lecanorchis cerina</i> Fukuyama	黃皿桂蘭	"
1211. <i>Liparis henryi</i> Rolfe	齒唇羊耳蒜	"
1212. <i>Liparis nakaharai</i> Hay.	長葉羊耳蒜	"
1213. <i>Liparis nervosa</i> (Thunb.) Lindl.	紅花羊耳蒜	"
1214. <i>Liparis nigra</i> Seidenf.	大花羊耳蒜	"
1215. <i>Liparis plicata</i> Franch. & Sav.	一葉羊耳蒜	"
1216. <i>Microtis unifolia</i> (Forst.) Reichb. f.	蓮葉蘭	"
1217. <i>Phaius tankervilleae</i> (Banks) Bl.	紅鶴蘭	"
1218. <i>Pholidota uraiensis</i> Hay.	烏來石山桃	"
1219. <i>Platanthera longibracteata</i> Hay.	長苞粉蝶蘭	"
1220. <i>Platanthera stenosepala</i> Schltr.	狹瓣粉蝶蘭	"
1221. <i>Spiranthes sinensis</i> (Pers.) Ames	綬草(金龍盤樹，盤龍參)	"
1222. <i>Tainia elliptica</i> Fukuyama	竹東杜鵑蘭	"
1223. <i>Tainia shimadai</i> Hay.	長葉杜鵑蘭	"
1224. <i>Zeuxine rupicola</i> Fukuyama	岩線柱蘭	"

附錄二 陽明山國家公園栽植植物名錄

學 名	中 名	用 途
A. Gymnospermae	裸子植物	
1. Cycadaceae	蘇鐵科	
1. <i>Cycas revoluta</i> Thunb.	蘇鐵	觀賞
2. Podocarpaceae	羅漢松科	
2. <i>Podocarpus macrophyllus</i> (Th.) D. Don	羅漢松	觀賞
3. Pinaceae	松科	
3. <i>Cedrus deodara</i> Roxb. ex Loud.	雪松	庭園樹，用材
4. <i>Pinus densiflora</i> Sieb et Zucc.	日本赤松	觀賞，用材
5. <i>P. echinata</i> Mill.	芒刺松	"
6. <i>P. insularis</i> Endl.	島松	"
7. <i>P. elliottii</i> Engelm.	濕地松	"
8. <i>P. luchuensis</i> Mayr.	琉球松	"
9. <i>P. massoniana</i> Lamb.	馬尾松	"
10. <i>P. rigida</i> Mill.	剛葉松	"
11. <i>P. taeda</i> L.	德達松	"
12. <i>P. thunbergii</i> Parl.	日本黑松	"
4. Taxodiaceae	杉科	
13. <i>Cryptomeria japonica</i> (L.f.) D. Don	柳松	觀賞，用材
14. <i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook.	杉木	貴重用材
15. <i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu & Cheng	水杉	珍貴樹種
5. Cupressaceae	柏科	
16. <i>Calocedrus formosana</i> (Florin) Florin	台灣肖楠	用材
17. <i>Chamaecyparis obtusa</i> Sied. et Zucc.	日本扁柏	貴重用材
18. <i>C. pisifera</i> (S. et Z.) Endl.	花柏	觀賞
19. <i>Juniperus chinensis</i> L. var. <i>Kaizuka</i> Hort. ex Endl.	龍柏	觀賞
20. <i>Thuja orientalis</i> L.	側柏	觀賞
B. Angiospermae	被子植物	
6. Casuarinaceae	木麻黃科	
21. <i>Casuarina equisetifolia</i> L.	木麻黃	觀賞，用材
7. Fagaceae	殼斗科	

學名	中名	用途
22. <i>Castanea crenata</i> Sied. & Zucc.	日本板栗	果食用
8. Moraceae	桑科	
23. <i>Ficus religiosa</i> L.	菩提樹	觀賞
9. Proteaceae	山龍眼科	
24. <i>Grevillea robusta</i> A. Cunn.	銀樺	觀賞
10. Chenopodiaceae	藜科	
25. <i>Kochia scoparia</i> (L.) Schrad.	地膚子	藥用
26. <i>Spinacia oleracea</i> L.	菠菜	葉菜
11. Nyctaginaceae	紫茉莉科	觀賞
27. <i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	南美紫茉莉	觀賞
28. <i>Mirabilis jalapa</i> L.	紫茉莉	觀賞
12. Portulacaceae	馬齒莧科	
29. <i>Portulaca grandiflora</i> Hook.	大花馬齒莧	觀賞
13. Amaranthaceae	莧科	
30. <i>Amaranthus inamoenus</i> Willd.	莧	葉菜
31. <i>A. tricolor</i> L.	雁來紅	觀賞
32. <i>Gomphrena globosa</i> L.	千日紅	觀賞
14. Magnoliaceae	木蘭科	
33. <i>Magnolia grandiflora</i> L.	洋玉蘭	觀賞
34. <i>Michelia alba</i> DC.	白玉蘭	觀賞
35. <i>M. fuscata</i> (Andr.) Bl.	含笑	觀賞
15. Annonaceae	番荔枝科	
36. <i>Artobotrys uncinatus</i> (Lam.) Merr.	鷺爪桃	觀賞
16. Theaceae	茶科	
37. <i>Camellia japonica</i> L.	山茶	觀賞
38. <i>C. sasanqua</i> Thunb.	茶梅	觀賞
39. <i>C. sinensis</i> (L.) Ktze.	茶	製茶葉
17. Cruciferae	十字花科	
40. <i>Brassica juncea</i> (L.) Coss.	芥菜	葉菜
41. <i>B. oleracea</i> L. var. <i>capitata</i> DC.	甘藍	葉菜
42. <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>acanthiformis</i> Nakai	蘿蔔	根菜
18. Rosaceae	薔薇科	
43. <i>Eriobotrya japonica</i> Lindl.	枇杷	果樹
44. <i>Prunus mume</i> Sieb. et Zucc.	梅	果樹，觀賞
45. <i>P. perisca</i> Stokes	桃樹	"

學名	中名	用途
46. <i>P. salicina</i> Linbl.	李	果樹
47. <i>P. yedoensis</i> Matsum.	日本櫻花	觀賞
48. <i>Rosa chinensis</i> Jacq.	薔薇	"
19. Leguminosae	豆科	
49. <i>Acacia mollisima</i> Willd.	黑烤	觀賞
50. <i>Albizia lebbeck</i> (L.) Benth.	大葉合歡	"
51. <i>Arachis hypogea</i> L.	落花生	種子食用
52. <i>Cassia acutifolia</i> Delile	旃那	觀賞
53. <i>C. glauca</i> Lam.	黃槐	"
54. <i>Dalbergia sissoo</i> Roxb.	印度黃檀	"
55. <i>Dolichos lablab</i> L.	鵝豆	果藥用
56. <i>Pachyrhizus erosus</i> (L.) Urban.	豆薯	根食用
57. <i>Pisum sativum</i> L.	豌豆	果食用
58. <i>Tephrosia candida</i> (Roxb.) DC.	白花鐵富豆	
20. Oxalidaceae	酢醬草科	
59. <i>Averrhoa carambola</i> L.	楊桃	果食用
21. Euphorbiaceae	大戟科	
60. <i>Acalypha wilkesiana</i> Muell.-Arg.	威氏鐵莧	觀賞
61. <i>Codiaeum variegatum</i> Blume	變葉木	"
62. <i>Euphorbia heterophylla</i> L.	猩猩草	"
63. <i>E. pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch	聖誕紅	"
64. <i>Excoecaria bicolar</i> Hassk. var. <i>purpurascens</i> Pax. et Hoffm.	青紫木	"
22. Rutaceae	芸香科	
65. <i>Citrus grandis</i> Osb.	柚子	果食
66. <i>C. maxima</i> (Burm. f.) Merr.	斗袖	果食用
67. a <i>C. sinensis</i> Osb. vas. <i>Sekken Hay.</i>	雪橙	"
67. b <i>C. sinensis</i> Osb. "Valenica".	華倫夏橙	"
68. <i>C. tonkan</i> Hay.	桶柑	"
23. Meliaceae	棟科	
69. <i>Aglaia odorata</i> Lour.	樹蘭	觀賞
24. Malvaceae	錦葵科	
70. <i>Hibiscus mutabilis</i> L.	芙蓉	觀賞
70. <i>Hibiscus mutabilis</i> L. var. <i>roseo-</i> <i>plenus</i> Nakai	重瓣芙蓉	"
71. <i>H. rosa-sinensis</i> L.	重瓣朱槿	觀賞

學名	中名	用途
72. <i>H. schizopetalus</i> Hook. f.	裂瓣朱槿	觀賞
73. <i>H. syriacus</i> L.	木槿	"
74. <i>Malvaviscus arboreus</i> (L.) Cav.	南美朱槿	"
25. Bombacaceae	木棉科	
75. <i>Bombax malabarica</i> DC.	木棉	觀賞
26. Caricaceae	番木瓜科	
76. <i>Carica papaya</i> L.	木瓜	果食用
27. Lythraceae	千屈菜科	賞
77. <i>Lawsonia inermis</i> L.	指甲花	觀賞
28. Myrtaceae	桃金娘科	
78. <i>Eucalyptus robusta</i> Sm.	大葉桉	觀賞，用材
79. <i>Eugenia javanica</i> Lamk	蓮霧	果樹
80. <i>Psidium guajava</i> Linn.	番石榴	果樹
29. Combretaceae	使君子科	
81. <i>Quisqualis indica</i> L.	使君子	藥用
30. Araliaceae	五加科	
82. <i>Polyscias balfouriana</i> Baik.	圓葉福祿桐	觀賞
31. Umbelliferae	繖形科	
83. <i>Coriandrum sativum</i> L.	胡荽(香菜)	香料
32. Ericaceae	杜鵑科	
84. <i>Rhododendron mucronatum</i> (Bl.) G. Don.	白花杜鵑	觀賞
85. <i>R. pulchrum</i> Sweet	艷紫杜鵑	"
86. <i>Rhododendron</i> spp.	日本杜鵑花類	"
33. Oleaceae	木犀科	
87. <i>Osmanthus fragrans</i> Lour.	桂花	觀賞
34. Apocynaceae	夾竹桃科	
88. <i>Allamanda cathartica</i> L.	軟枝黃蟬	觀賞
89. <i>Nerium indicum</i> Mill.	夾竹桃	"
90. <i>Plumeria rubra</i> L. var. <i>acutifolia</i> (Poir. ex Lam.) Bailey	緬梔	"
91. <i>Tabernaemontana divaricata</i> (L.) R. Br. ex Roem.	山馬茶	"
92. <i>Vinca rosea</i> L.	日日春	"
35. Rubiaceae	茜草科	
93. <i>Gardenia angusta</i> Merr. var. <i>grandiflora</i> Hort.	大花黃梔花	"

學名	中名	用途
94. <i>G. jasminoides</i> Ellis var. <i>radicans</i> (Thunb.) Makino	小梔子	觀賞，香料
36. <i>Ixora chinensis</i> Lamk.	仙丹花	觀賞
Verbenaceae	馬鞭草科	
95. <i>Duranta repens</i> L.	金露花	"
97. <i>Lantana camara</i> L.	馬纓丹	"
37. Solanaceae	茄科	
98. <i>Datura suaveolens</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	大花曼陀羅	"
99. <i>Lycianthes biflora</i> Bitter.	二花枸把	藥用
100. <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	蕃茄	果食用
101. <i>Nicotiana tabacum</i> L.	煙草	製香煙
38. Compositae	菊科	
102. <i>Chrysanthemum segetum</i> L.	(筒蒿)孔雀菊	葉菜
103. <i>Gynura bicolor</i> (Willd.) DC.	紅鳳菜	
104. <i>Helianthus debilis</i> Nutt. var. <i>cucumerifolius</i> Hort.	瓜葉向日葵	觀賞
105. <i>Lactuca sativa</i> L.	萵苣	葉菜
39. Liliaceae	百合科	
106. <i>Allium bakeri</i> Regel	薑	
107. <i>A. fistulosum</i> L.	葱	佐料
108. <i>A. odorum</i> L.	韭菜	葉菜
109. <i>A. scorodoprasum</i> L. var. <i>viviparum</i> Regel.	大蒜	佐料
110. <i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L.	金針葉	花食用，觀賞
40. Agavaceae	龍舌蘭科	
111. <i>Agave americana</i> L.	龍舌蘭	觀賞
112. <i>Cordyline fruticosa</i> (L.) Goepf.	朱蕉	"
113. <i>Sanservieria trifasciata</i> Prain	虎尾蘭	"
41. Amaryllidaceae	石蒜科	
114. <i>Zephyranthes candida</i> (Lindl.) Herb.	葱蘭	觀賞
42. Iridaceae	鳶尾科	
115. <i>Belamcanda chinensis</i> (L.) DC.	射干	觀賞
116. <i>Iris japonica</i> Thunb.	蝴蝶花	"
43. Bromeliaceae	鳳梨科	
117. <i>Ananas comosus</i> (L.) Merr.	鳳梨	果食用
44. Gramineae	禾本科	

學名	中名	用途
118. <i>Arundinaria variegata</i> (Sied.) Makino	稚子竹	觀賞
119. <i>Bambusa dolichoclada</i> Hay.	長枝竹	用材
120. <i>B. dolichomerithalla</i> Hay.	火廣竹	用材
121. <i>B. multiplex</i> (Lour.) Raeuschel	蓬萊竹	生籬
122. <i>B. oldhamii</i> Munro	綠竹	筍食用
123. <i>B. pachinensis</i> Hay.	八芝蘭竹	生籬
124. <i>B. stenostachya</i> Hackel	刺竹	用材
125. <i>B. vulgaris</i> Schrad. ex Wendl. var. <i>striata</i> (Lodd.) Gamble	金絲竹	觀賞
126. <i>Dendrocalamus latiflorus</i> Munro	麻竹	筍食用，用材
127. <i>Oryza sativa</i> L.	水稻	糧食
128. <i>Phyllostachys makinoi</i> Hay.	桂竹	用材
129. <i>P. nuda</i> McClure.	裸箨竹	觀賞
130. <i>P. pubescens</i> Mazel ex H. de Leh.	孟宗竹	筍食用，用材
45. Palmae	棕櫚科	
131. <i>Caryota mitis</i> Lour.	叢立孔雀椰子	觀賞
132. <i>Chrysalidocarpus lutescens</i> W.	黃椰子	"
133. <i>Phoenix humilis</i> Royle var. <i>loureiri</i> (Kunth Becc.)	羅比親王椰子	"
134. <i>Rhapis excelsa</i> (Thunb.) Henry ex Rehd.	觀音棕竹	"
135. <i>Trachycarpus wagnerianus</i> Becc.	棕櫚	建築，觀賞
46. Araceae	天南星科	
136. <i>Acorus calamus</i> L.	白菖	觀賞
137. <i>Colocasia gigantea</i> Hook. f.	土芝	"
138. <i>C. esculenta</i> (L.) Schott.	芋	
47. Musaceae	芭蕉科	
139. <i>Musa sapientum</i> L.	香蕉	果食用
48. Zingiberaceae	薑荷科	
140. <i>Curcuma domestica</i> Valet	鬱金	薑食用
141. <i>Zingiber officinale</i> Rosc.	薑	"
142. <i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Sm.	薑花	藥用
49. Cannaceae	曼華科	
143. <i>Canna coccinea</i> Mill.	紅花美人蕉	觀賞
144. <i>C. flaccida</i> Salisb.	黃花美人蕉	"
145. <i>C. indica</i> L. var. <i>orientalis</i> (Rosc.) Hook. f.	美人蕉	"
146. <i>C. warscewiczii</i> Otto	紫葉美人蕉	"